本草衍義

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

本草衍義

寇宗奭編撰

本館據十萬卷樓
叢書本排印初編
各叢書僅有此本

重刻本草衍義序

本草衍義二十卷。宋通直郎。添差充收買藥材所。辨驗藥材。寇宗奭撰。晁公武讀書志。陳直齋書錄解題。皆著於錄。政和六年。提舉荊湖北路常平等事劉亞夫申投尚書省。太醫學博士李康看詳狀申。有旨轉一官。添差充收買藥材所。辨驗藥材。宣和元年。其姪宣教郎知解州解縣丞寇約鏤板印行。宗奭里貫無考。以劄付及卷六礬石條。菊花水條。卷十三桑寄生條推之。知其曾官杭州永耀順安軍等處。由承直郎。澧州司戶進書轉一官而已。神農本草之名。始見於梁七錄。凡三百六十五種。陶隱居又增三百六十五種。是爲名醫別錄。唐顯慶中。命蘇恭等參考得失。增一百一十四種。是爲唐本草。宋太祖命劉翰等。以醫家嘗用有效者。增一百三十三種。是爲開寶重定本草。仁宗命掌禹錫等。再加校正。增一百種。是爲嘉祐補註本草。蜀人唐愼微博採羣書。增六百餘種。是爲經史證類本草。徽宗又命曹孝忠刊正之。是爲政和重修經史證類備用本草。宗奭以禹錫所修。愼微所續。尚有差失。因考諸家。參以目驗。拾遺糾謬。著爲此書。凡名未用而意義已盡者。皆不編入。其所辨證。如東壁土取太陽少火之壯。冬灰取冬令燒灼之久。水味不因菊花而香。鼷鼠不能遺溺生子。玉泉爲玉漿之譌。石中黃子爲黃水之譌。皆能實事求是。疏通證明。洵乎本草之功臣。醫林之津筏也。宋時與證類本草別本單行。自金人張存惠採附證類本草之中。明人因之。而單行本遂微。余所藏爲南宋麻沙本。完善無缺。因重梓以廣其傳。

光緒三年歲在彊圉赤奮若仲冬之月歸安陸心源撰

本草衍義目錄

第一卷
序例上
第二卷
序例中
第三卷
序例下
第四卷
其神農本經。名醫別錄。唐本先附。今附新補新定之目。緣本經已著。此更不聲說。
玉泉　丹砂　空青
綠青　雲母　石鍾乳
朴消　芒消　消石
英消　礬石　滑石
紫石英　白石英　赤石脂

白石脂　石中黃　婆娑石
無名墨　菩薩石
第五卷
金屑　銀屑生銀附　水銀
水銀粉　雄黃　雌黃
石硫黃　陽起石　凝水石
石膏　磁石　理石
鐵礦　食鹽　太陰玄精石
蜜陀僧　桃花石　花乳石
珊瑚　馬腦　石花
石蟹　石蛣
第六卷
青琅玕　礬石　代赭白□墨赤□土
大鹽　戎鹽　鉛丹

粉錫　鉛霜　古文錢
金牙　石灰　冬灰餅爐灰
伏龍肝東壁土附　半天河臘雪水東流水　井華水倒流水附　菊花水
漿水　熱湯　硇砂
蓬砂　礬石　自然銅
石鹽　砒霜　浮石
金星石　銀星石
第七卷　天門冬　麥門冬
赤箭　地黃　菖蒲
蒼朮　山藥　菊花
澤瀉　人參　石斛
甘草　細辛　茈胡
牛膝　車前子　芜蔚子
薏苡仁　菟絲子　巴戟天
木香

第八卷
肉蓯蓉　蒺藜白蒺藜附　防風
黃耆　千歲藟　黃連
藍實　景天　蒲黃
蘭草　茵陳蒿　決明子
芎藭　五味子　旋花
第九卷
當歸　芍藥　生薑
麻黃　葛根　栝樓
苦參　石龍芮　瞿麥
白芷　杜衡　紫菀
百合　酸醬　蠡實
石香薷
第十卷
款冬花　牡丹　女菀

澤蘭　地楡　白前
王瓜　薺苨　積雪草
莎草　惡實　大小薊
艾葉　陟釐　蒴藋
白藥　檓香子　鬱金
肉豆蔻　茅香花　青黛
零陵香　天麻　華撥
使君子　蜜蒙花
第十一卷　桔梗　甘遂
大黃　羨音饒餘花　旋復花
藜蘆　烏頭　射干
半夏　蜀漆　常山
青箱子　白蘞　白及
草蒿

第十二卷
連翹　白頭翁　茼茹
羊蹄　葫蕙　夏枯草
蠶休　虎杖　馬勃
蛇苺　苧根　菰根
蒴草　牽牛子　蓖麻子
葎草　獨行根　芭蕉
蒲公草　水紅子　角蒿
雀麥　骨碎補　馬兜
燈心草　威靈仙　何首烏
五倍子　金櫻子　萱草
葫蘆巴　金星草　木賊
第十三卷
茯苓　琥珀　松黃子附
栢　柱桂心附　楓香

乾漆　蔓荊實　桑寄生
沈香 薰陸香附　丁香　藥木
辛夷　檢皮　蕪荑
酸棗　槐實　槐莢
槐花　枸杞
第十四卷
龍眼　厚朴 殼　猪苓
竹葉　枳實 枳殼附　山茱萸
吳茱萸　梔子　檳榔
合歡　秦椒　衝矛
紫葳　蕪荑　茗苦茶
桑根白皮　白棘　龍腦
菴摩勒　紫鉚　天竺黃
天竺桂　烏藥　沒藥
墨

第十五卷
石楠　蜀椒　莽草
郁李仁　鼠李　欒華
杉　楠材　榧實
樗木皮　白楊　欒荊
紫荊木　釣藤子　檵藤子
皂莢　柳華　桐葉
烏臼　訶梨勒　椿木葉 椿莢附
胡椒　橡實　無石子
槲若　黃藥　無患子
椰子　樺木皮　赤櫟木
木鱉子　木槿　櫻櫚木
柘木　八乳　八屎
第十六卷
髮髮 亂髮附

人溺　人指甲今補　龍骨
牛黃　麝　象牙
醍醐　犀角　羚羊角
羖羊角　牛角鰓　白水牛鼻牛尿附　虎骨
犬膽　鹿茸　兔
豹肉　鼬鼠音宥　猬豬附　獺
狐　鼷鼠音偃　野猪家猪附
騧肉　狸骨　麂
野駝　腽肭臍　丹雉雞
敗鼓皮　鴈　鷓鴣
鷲　鷹屎白　雀卵
雉　伏翼　孔雀
鸛　白鴿　斑鳩

鶉

第十七卷

石蜜　牡蠣　桑螵蛸

海蛤　石決明　眞珠

秦龜　瑇瑁　鯉魚

蠯魚　鱔魚　鱓魚

鯽魚　蝟皮　石龍子

露蜂房　槜雞　蚱蟬

白殭蠶　木蟲　蜚蠊

蝤蠐　蛞音闊蝓音俞　水蛭

鼈甲　烏賊魚　蠑螈

原蠶蛾　蠶退　鰻鱺魚

鮫魚　河鮞　紫貝

鱸魚　蝦蟆　蠮

蛤蚧　鮫鯉甲　蜘蛛

蜻蛉　石蠶　蛇蛻
蛇黃　金蛇　烏蛇
白花蛇　蜈蚣　馬陸
蠐螬　雀瓮　鼠婦
螢　衣魚　白頭蚯蚓
螻蛄　蜣蜋　斑貓
馬刀　貝子　甲香
蝎　五靈脂
第十八卷　葡萄　蓬藥
豆蔻　大棗　雞頭實
覆盆子　芰　栗
藕實　橘柚　乳柑子
櫻桃　梅實　枇杷葉
橙子皮　木賊　甘蔗
柿

石蜜
烏芋
杏實
胡桃
菴蘿果
榲桲
第十九卷
白瓜子
甜瓜
黃蜀葵花子 附
蒿苣 苦苣附
蔘實 水紅附
松菜
韭
水蘇
沙糖
荔枝
桃核仁
李核仁
安石榴
白冬瓜
冬葵子
莧實 紅人莧附
蕪菁
芥
葱實
白冀荷
假蘇
芋
杏核仁
獼猴桃
梨
橄欖
瓜蒂
蜀葵
苦菜
菜菔根
苜蓿
薤
蘇
香薷

薄荷　蘘蕘音縷　葫
蒜　芸薹　茄子
馬齒莧
第二十卷
胡麻　青蘘　大麻子
白油麻　飴糖　生大豆
赤小豆　大麥　青黃白粮米
粟米　丹黍米　蘘米
秫米　陳廩米　酒
穬豆　粳米　稻米
稷米　鼳子粟　醋
醬　小麥

本草衍義卷之一

宋　通直郎添差充收買藥材所辨驗藥材寇宗奭編撰

序例上

衍義總敍

天地以生成爲德。有生所甚重者身也。身以安樂爲本。安樂所可致者。以保養爲本。世之人。此本其根則本必固。本既固。疾病何由而生。夭橫何由而至。此攝生之道無逮於此。夫草木無知。猶假養既孙人爲萬物之靈。豈不資以保養。然保養之義其理萬計。約而言之其術有三。一養神。二惜氣。三隄疾。忘情去智。恬澹虛無。離事全眞。內外無寄。加是則神不內耗。境不外惑。眞一不雜。則神自寧矣。此養神也。抱一元之本根。固歸精之眞氣。三焦定位。六賊忘形。識界既空。大同斯契。則氣自定矣。此惜氣也。飲食適時。溫涼合度。出處無犯於八邪。寤寐不可以免強。則身自安矣。此隄疾也。三者甚易行。然人自以謂難行。而不肯行。如此雖有長生之法。人罕敦尚。遂至永謝。是以疾病交攻。天和頓失。聖人憫之。故假以保救之術。輔以醫痾之藥。俾有識無識。咸臻壽域。所以國家編撰聖惠。校正素問。重定本草。別爲圖經。至于張仲景傷寒論。及千金金匱。外臺之類。粲然列於書府。今復考拾天下醫生。補以名職。分隸曹屬。普救世人之疾苦。茲蓋全聖至德之君。合天地之至仁。接物厚生。大貸天下。故野無遺逸之藥。世無不識之病。然本草二部。其間撰著之人。或執用己私。失於商較。致使學者檢據之間。不得無惑。今則併考諸家之說。參之實事。有未盡厥

理者。衍之以臻其理。如東壁土倒流水冬灰之類。隱避不斷者。伸之以見其情。如水自菊下過而水香。鼷鼠咮椅墜地而生子。文簡誤脫者。證之以明其義。如玉泉石鍾之類。諱避而易名者。原之以存其名。如山藥避本朝諱。及唐避代宗諱。使是非歸一。治療有源。檢用之際。曉然無惑。是以搜求訪緝者十有餘年。採拾衆善。膠療疾苦。和合收蓄之功。率皆周盡。矧疾爲聖人所謹。無常不可以爲醫。豈容易言哉。宗奭常謂疾病所可憑者醫也。醫可據者方也。方可恃者藥也。苟知病之虛實。方之可否。若不能達藥性之良毒。辨方宜之早晚。眞僞相亂。新陳相錯。則曷由去道人陳宿之蠹。唐甄立言仕爲太常丞善醫術有道人心腹懣煩。瀰二歲。診曰。腹有蠱。誤食髮而然。令生張果駢潔之齒。唐張果詔見。元宗謂高力士曰。吾聞飲葷無苦者奇士也。餌雄黃一劑。少選吐一虵。如拇無目。燒之有髮氣。乃愈。時天寒。取以飲果。三進。頓然曰。非桂酒乃寢。頃視齒爛縮。顧左右取鐵如意擊墮之。藏帶中。更出藥。傳其斷良久。齒已生。粲然駢潔。帝益神之。此書之意於是乎作。今則編次成書。謹依二經類例。分門條析。仍衍序例爲三卷。內有名未用及意義已盡者。更不編入。其神農本經。名醫別錄。唐本先附。今附新補新定之目。緣本經已著目錄內。更不聲說。依舊作二十卷。及目錄一卷。目之曰本草衍義。若博愛衞生之士。志意或同。則更爲詮脩以稱聖朝好生之德。時政和六年丙申歲記。

本草之名。自黃帝岐伯始。其補注總敍言舊說本草經者。神農之所作。而不經乎帝紀。元始五年。舉天下通知方術本草者。所在軺傳。遣詣京師。此但見本草之名。終不能斷自何代而作。又樓護傳。稱護少誦醫經本草方術。數十萬言。本草之名。蓋見於此。是尤不然也。世本曰。神農嘗百草以和藥。濟人。然亦不著本

草之名。皆未臻厥理。嘗讀帝王世紀曰。黃帝使岐伯嘗味草木。定本草經。造醫方以療衆疾。則知本草之名。自黃帝岐伯始。其淮南子之言。神農嘗百草之滋味。一日七十毒。亦無本草之說。是知此書。乃上古聖賢具生知之智。故能辨天下品物之性味。合世人疾病之所宜。後之賢智之士。從而和之者。又增廣其品。至一千八十二名。補注本草稱一千八十二種。然一種有分兩可謂大備。然其間注說不盡。或捨理別趣者。往往多矣。是以衍撫餘義。期於必當。非足以發明聖賢之意。冀有補於闕疑。

夫天地既判。生萬物者惟五氣爾。五氣定位。則五味生。五味生。則千變萬化。至於不可窮已。故曰生物者氣也。成之者味也。以奇生。則成而耦。以耦生。則成而奇。寒氣堅。故其味可用以耎。熱氣耎。故其味可用以堅。風氣散。故其味可用以收。燥氣收。故其味可用以散。土者冲氣之所生。冲氣則無所不和。故其味可用以緩。氣堅則壯。故苦可以養氣。脈耎則和。故鹹可以養脈。骨收則強。故酸可以養骨。筋散則不攣。故辛可以養筋。肉緩則不壅。故甘可以養肉。堅之而後可以耎。收之而後可以散。欲緩則用甘。不欲則弗用。用之不可太過。太過亦病矣。古之養生治疾者。必先通乎此。不通乎此。而能已人之疾者。蓋寡矣。

夫安樂之道。在能保養者得之。況招來和氣之藥。少攻決之藥多。不可不察也。是知人之生。須假保養。無犯和氣。以資生命。纔失將護。便致病生。苟或處治乖方。旋見顛越。防患須在閑日。故曰安不忘危。存不忘亡。此聖人之預戒也。

攝養之道。莫若守中。守中則無過與不及之害。經曰。春秋冬夏四時陰陽、生病、起於過用。蓋不適其性。而

強去爲逐。強處、卽病生。五臟受氣蓋有常分。用之過耗。是以病生。善養生者既無過耗之弊。又能保守眞元。何患乎外邪所中也。故善服藥。不若善保養。不善保養。不若善服藥。世有不善保養。又不善服藥。倉卒病生。而歸咎於神天。噫。是亦未嘗思也。可不謹歟。

夫未聞道者。放逸其心。逆於生樂。以精神徇智巧。以憂畏徇得失。以勞苦徇禮節。以身世徇財利。四徇不置。心爲之病矣。極力勞形。躁暴氣逆。當風縱酒。食嗜辛鹹。肝爲之病矣。飮食生冷。溫涼失度。久坐久臥。大飽大飢。脾爲之病矣。呼叫過常。辨爭陪答。冒犯寒暄。恣食鹹苦。肺爲之病矣。久坐濕地。強力入水。縱慾勞形。三田漏溢。腎爲之病矣。五病既作。故未老而羸。未羸而病。病至則重。重則必斃。嗚呼。是皆弗思而自取之也。衞生之士。須謹此五者。可致終身無苦。經曰。不治已病。治未病。正爲此矣。

夫善養生者養內。不善養生者養外。養外者實外。以充快悅澤。貪欲恣情爲務。殊不知外實則內虛也。善養內者實內。使臟腑安和。三焦各守其位。飮食常適其宜。故莊周曰。人之可畏者。衽席飮食之間。而不知爲之戒者。過也。若能常如是畏謹。疾病何緣而起。壽考焉得不長。賢者造形而悟。愚者臨病不知。誠可畏也。

夫柔情難綰而不斷。不可不以智惠決也。故幃箔不可不遠。斯言至近易。其事至難行。蓋人之智惠淺陋。不能勝其貪欲也。故佛書曰。諸苦所因。貪欲爲本。若滅貪欲。何所依止。是知貪欲不滅。苦亦不滅。貪欲滅。苦亦滅。聖人言近而指遠。不可不思。不可不懼。善攝生者。不勞神。不苦形。神形既安。禍患何由而致也。

夫人之生以氣血爲本。人之病未有不先傷其氣血者。世有童男室女。積想在心。思慮過當。多致勞損。男則神色先散。女則月水先閉。何以致然。蓋愁憂思慮則傷心。心傷則血逆竭。血逆竭故神色先散。而月水先閉也。火既受病。不能榮養其子。故不嗜食。脾既虛則金氣虧。故發咳嗽。既作水氣絕。故四肢乾。木氣不充。故多怒。鬢髮焦。筋痿。俟五臟傳遍。故卒不能死。然終死矣。此一種於諸勞中最爲難治。蓋病起於五臟之中。無有已期。藥力不可及也。若或自能改易心志。用藥扶接。如此則可得九死一生。舉此爲例。其餘諸勞。可按脈與證而治之。

夫治病有八要。八要不審。病不能去。非病不去。無可去之術也。故須審辨八要、庶不違誤。其一曰虛。五虛是也。脈細皮寒氣少泄利前後皆食不入此爲五虛二曰實。五實是也。脈盛皮熱腹脹前後不通悶欲此五實也三曰冷。臟腑受其積冷是也。四曰熱。臟腑受其積熱是也。五曰邪。非臟腑正病也。六曰正。非外邪所中也。七曰內。病不在外也。八曰外。病不在內也。既先審此八要。參知六脈。審度所起之源。繼以望聞問切。加諸病者。烏有不可治之疾也。夫不可治者有六失。失於不審。失於不信。失於過時。失於不擇醫。失於不識病。失於不知藥。六失之中。有一於此。卽爲難治。非止醫家之罪。亦病家之罪也。矧又醫不慈仁。病者猜鄙。二理交馳。於病何益。由是言之。醫者不可不慈仁。不慈仁則招禍。病者不可猜鄙。猜鄙則招禍。惟賢者洞達物情。各就安樂。亦治病之一說耳。

合藥分劑料理法則中言。凡方云用桂一尺者。削去皮畢。重半兩爲正。既言廣而不言狹。如何使以半兩爲正。且桂卽皮也。若言削去皮畢。卽是全無桂也。今定長一尺。闊一寸。削去皮上麁虛無味者。約爲半兩。

然終不見當日用桂一尺之本意。亦前人之失也。

序例。藥有酸鹹甘苦辛五味。寒熱溫涼四氣。今詳之。凡稱氣者。卽是香臭之氣。其寒熱溫涼。則是藥之性。且如鵝條中云。白鵝脂性冷。不可言其氣冷也。況自有藥性。論其四氣。則是香、臭、臊、腥。故不可以寒熱溫涼配之。如蒜、阿魏、鮑魚、汗臛。則其氣臭。雞、魚、鴨、虵。則其氣腥。腎、狐狸、白馬莖。褪近隱處。人中白。則其氣臊。沉檀龍麝。則其氣香。如此則方可以氣言之。其序例中氣字。恐後世誤書。當改爲性字。則於義方允。

今人用巴豆。皆去油訖生用。茲必爲本經言生溫。熟寒。故欲避寒而卽溫也。不知寒不足避。當避其大毒。矧本經全無去油之說。故陶隱居云。熬令黃黑。然亦太過矣。日華子云。炒、不如去心膜。煑五度。換水各煑一沸。爲佳。其杏仁、桃仁、葶藶、胡麻。亦不須熬至黑。但慢火炒令赤黃色。斯可矣。

凡服藥多少雖有所說一物一毒。服一丸如細麻之例。今更合別論。緣人氣有虛實。年有老少。病有新久。藥有多毒少毒。更在逐事斟量。不可舉此爲例。但古人凡設例者。皆是假令。豈可執以爲定法。

本草第一序例。言犀角、羚羊角、鹿角、一槩末如粉。臨服內湯中。然今昔藥法中。有生磨者。煮取汁者。且如丸藥中用蠟。取其能固護藥之氣味。勢力全備。以過關鬲而作效也。今若投之蜜相和。雖易爲丸劑。然下咽亦易散化。如何得到臟中。若其間更有毒藥。則便與人作病。豈徒無益而又害之。全非用蠟之本意。至如桂心於得更有上虛軟甲錯處。可削之也。凡此之類。亦更加詳究。

今人用麻黃。皆合揭諸藥中。張仲景方中。皆言去上沫。序例中言。先別煑三兩沸。掠去其沫。更益水如本

數。乃內餘藥。不爾。令人發煩。甚得用麻黃之意。醫家可持此說。然云折去節。令通理。寸剉之。寸剉不若碎剉。如豆大爲佳。藥味易出。而無遺力也。

陶隱居云。藥有宣、通、補、洩、輕、重、澀、滑、燥、濕。此十種今詳之。惟寒熱二種。何獨見遺。如寒可去熱。大黃朴消之屬是也。如熱可去寒。附子桂之屬是也。今物補此二種。以盡厥旨。

本草衍義卷之二

序例中

人之生。實陰陽之氣所聚耳。若不能調和陰陽之氣。則害其生。故寶命全形篇論曰。人以天地之氣生。又曰天地合氣。命之曰人。是以陽化氣陰成形也。夫遊魂爲變者。陽化氣也。精氣爲物者。陰成形也。陰陽氣合。神在其中矣。故陰陽應象大論曰。天地之動靜。神明爲之綱紀。卽知神明不可以陰陽攝也。易所以言陰陽不測之謂神。蓋爲此矣。故曰神不可大用。大用卽竭。形不可大勞。大勞則斃。是知精氣神人之大本。不可不謹養。智者養其神。惜其氣。以固其本。世有不謹衞生之經者。動皆觸犯。既以犯養生之禁。須假以外術保救。不可坐以待斃。本草之經。於是興焉。既知保救之理。不可不窮保救之事。衍義於是存焉。二者其名雖異。其理僅同。欲使有知無知盡臻壽域。率至安樂之鄉。適是意者求其意而可矣。

養心之道。未可忽也。六欲七情。千變萬化。出沒不定。其言至簡。其義無窮。而以一心對無窮之事。不亦勞乎。心苟不明。不爲物所病者。未之有也。故明達之士。遂至忘心。心既忘矣。則六欲七情無能爲也。六欲七情無能爲。故內事不生。內事不生。故外患不能入。外患不能入。則本草之用。實世之藪狗耳。若未能達是意而至是地。則未有不緣六欲七情而起憂患者。憂患既作。則此書一自不可閒也。愚何人哉。必欲斯文絕人之憂患乎。

右隱居以謂凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵擣數百過如此恐乾末溜蕩不可擣不若令力士合研爲佳又曰凡湯酒膏中用諸石皆細擣之如粟亦可以葛布篩令調勻並以綿裹內中其雄黃朱砂輩細末如粉今詳之凡諸石雖是湯酒中亦須稍細藥力方盡出效亦速但臨服須澄濾後再上火不爾恐遺藥力不見效湯酒中尙庶幾若在服食膏中豈得更加粟也不合如此立例常在臨時應用詳酌爾又說咬咀兩字唐本注謂爲商量斟酌非也嘉祐復符陶隱居說爲細切亦非也儒家以謂有含味之意如人以口齒咀嚼雖破而不塵但使含味耳張仲景方多言咬咀其義如此

病人有旣不洞曉醫藥復自行臆度如此則九死一生或醫人未識其病或以財勢所迫占奪強治如此之輩醫家病家不可不察也要在聰明賢達之士掌之則病無不濟醫無不功世間如此之事甚多故須一一該舉以隄或然

夫人有貴賤少長病當別論病有新久虛實理當別藥蓋人心如面各各不同惟其心不同臟腑亦異臟腑旣異乃以一藥治衆人之病其可得乎故張仲景曰又有土地高下不同物性剛柔飡居亦異是故黃帝與四方之間岐伯舉四治之能臨病之功宜須兩審如是則依方合藥一槩而用亦以疎矣且如貴豪之家形樂志苦者也衣食足則形樂心慮多則志苦岐伯曰病生於脈形樂則外實志苦則內虛故病生於脈所養旣與貧下異憂樂思慮不同當各逐其人而治之後世醫者直委此一節閉絕不行所失甚矣嘗有一醫官暑月與貴人飮貴人曰我昨日飮食所傷今日食減醫曰可餌消化藥佗人當服十丸公當

減其半下嚥未久疎逐不已幾致斃以此較之虛實相遼不可不察故曰病當別論又有一男子暑月患血痢醫者妄以涼藥逆制專用黃連阿膠木香藥治之此藥始感便治則可今病久腸虛理不可服蹤句不已幾致委頓故曰理當別藥如是論之誠在醫之通變又須經歷則萬無一失引此爲例餘可效此

凡用藥必須擇州土所宜者則藥力具用之可據如上黨人參川蜀當歸齊州半夏華州細辛又如東壁土冬月灰半天河水熱湯漿水之類其物至微其用至廣蓋亦有理若不推究厥理治病徒費其功終亦不能活人聖賢之意不易盡知然捨理何求哉

凡人少長老其氣血有盛壯衰三等故岐伯曰少火之氣壯壯火之氣衰蓋少火生氣壯火散氣況復衰火不可不知也故治法亦當分三等其少日服餌之藥於壯老之時皆須別處之決不可忽也世有不留心於此者往往不信遂致困危哀哉

今人使理中湯丸倉卒之間多不效者何也是不知仲景之意爲必效藥蓋用藥之人有差殊耳如治胃痺心中痞堅氣結胃滿脅下逆氣搶心治中湯主之人參、朮、乾薑、甘草四物等共一十二兩水八升煮取三升每服一升日三服以知爲度或作丸須雞子黃大皆奇效今人以一丸如湯梅許服之病既不去乃曰藥不神非藥之罪用藥者之罪也今引以爲例他可倣此然年高及素虛寒人當逐宜減甘草

夫高醫以蓄藥爲能倉卒之間防不可售者所須也若桑寄生、桑螵蛸、鹿角膠、天靈蓋、虎膽、蟾酥、野驢蜜、蓬藁空青、婆娑石、石蠏、冬灰臘雪水、松黃之類如此者甚多不能一一遍舉唐元澹字行冲嘗謂狄仁傑

曰下之事上。譬富家儲積以自資也。脯腊膜胰。以供滋膳。參朮芝桂。以防疾疢。門下充旨味者多矣。願以小人備一藥可乎。仁傑笑曰。公正吾藥籠中物。不可一日無也。然梁公因事而言。獨譬之以藥。則有以見天下萬物之中。尤不可闕者也。知斯道者。知斯意而已。

凡爲醫者。須略通古今。粗守仁義。絕馳騖能所之心。專博施救拔之意。如此則心識自明。神物來相。又何必戚戚沽名。齪齪求利也。如或不然。則曷以致姜撫沽譽之慙。逋華佗之矜。能受戮乎。

嘗讀唐方技傳。有云。醫要在視脈。唯用一物攻之。氣純而愈速。一藥偶得。他藥相制。弗能專力。此難愈之驗也。今詳之。病有大小新久虛實。豈可止以一藥攻之。若初受病。小則庶幾。若病大多日。或虛或實。豈得不以他藥佐使。如人用硫黃。皆知此物大熱。然石性緩。倉卒之間。下咽不易。便作效。故智者又以附子乾薑桂之類。相佐使以發之。將併力攻疾。庶幾速效。若單用硫黃。其可得乎。故知許嗣宗之言未可全信。賢者宜審度之。

夫用藥如用刑。刑不可誤。誤即千人命。用藥亦然。一誤即便隔生死。然刑有鞫司。鞫成然後議定。議定然後書罪。蓋人命一死。不可復生。故須如此詳謹。今醫人纔到病家。便以所見用藥。若高醫識病知脈。藥又相當。如此、即應手作效。或庸下之流。孟浪亂投湯劑。逡巡便致困危。如此殺人。何太容易。世間此事甚多。良由病家不擇醫。平日未嘗留心於醫術也。可不懼哉。

本草衍義卷之三

序例下

治婦人雖有別科。然亦有不能盡聖人之法者。今豪足之家。居奧室之中。處幃幔之內。復以帛幪手臂。既不能行望色之神。又不能殫切脈之巧。四者有二闕焉。黃帝有言曰。凡治病。察其形氣色澤。形氣相得。謂之可治。色澤以浮。謂之易已。形氣相失。謂之難治。色夭不澤。謂之難已。又曰。診病之道。觀人勇怯。骨肉皮膚。能知其情。以爲診法。若患人脈病不相應。既不得見其形。醫人止據脈供藥。其可得乎。如此言之。烏能盡其術也。此醫家之公患。世不能革。醫者不免盡理質問。病家見所問繁。以爲醫業不精。往往得藥不肯服。似此甚多。扁鵲見齊侯之色。尚不肯信。況其不得見者乎。嗚呼可謂難也已。

又婦人病溫已十二日。診之。其脈六七至而澀。寸稍大。尺稍小。發寒熱。頰赤口乾。不了了。耳聾。問之。病後數日。經水乃行。此屬少陽熱入血室也。若治不對病。則必死。乃按其證。與小柴胡湯服之。二日。又與小柴胡湯。加桂枝乾薑湯。一日。寒熱遂已。又云。我臍下急痛。又與抵黨丸。微利。臍下痛痊。身漸涼和。脈漸勻。尚不了了。乃復與小柴胡湯。次日云。我但胷中熱燥。口鼻乾。又少與調胃承氣湯。不得利。次日又云。心下痛。又與大陷胷丸半服。利三行。而次日虛煩不寧。時妄有所見。時復狂言。雖知其尚有燥屎。以其極虛。不敢攻之。遂與竹葉湯。去其煩熱。其夜大便自通。至曉兩次。中有燥屎數枚。而狂言虛煩盡解。但咳嗽唾沫。此

肺虛也。若不治。恐乘虛而成肺痿。遂與小柴胡。去人參大棗生薑。加乾薑五味子湯。一日咳減。二日而病悉愈。已上皆用張仲景方。

有婦人病吐逆。大小便不通。煩亂。四肢冷。漸無脈息。一日半。與大承氣湯兩劑。至夜半漸得大便通。脈漸生。翌日乃安。此關格之病。極難治。醫者當謹審也。經曰關則吐逆。格則不得小便。如此亦有不得大便者。

有小兒病虛滑。食略化。大便日十餘次。四肢柴瘦。腹大。食訖又饑。此疾正是大腸移熱於胃。善食而瘦。又謂之食㐱者。時五六月間。脈洪大。按之則絕。今六脈既單洪。則夏之氣獨然。按之絕。則無胃氣也。經曰夏脈洪洪多胃氣。少曰病。但洪、無胃氣曰死。夏以胃氣爲本。治療失於過時。後不逾旬果卒。

有人病久嗽。肺虛生寒熱。以款冬花焚三兩芽。俟煙出。以筆管吸其煙滿口。則嚥之。至倦則已。凡數日之間。五七作。差。

有人病瘧月餘日。又以藥吐下之。氣遂弱。疾未愈。觀其病與脈。乃夏傷暑。秋又傷風。乃與柴胡湯一劑。安後。又飲食不節。寒熱復作。此蓋前以傷暑。今以飲食不謹。遂致吐逆不食。脇下牽急而痛。寒熱無時。病名痰瘧。以十棗湯一服。下痰水數升。明日又與理中湯二錢。遂愈。

有人苦風痰。頭痛。顫掉、吐逆。飲食減。醫以爲傷冷物。遂以藥溫之。不愈。又以丸藥下之。遂厥。復與金液丹。後譫言。吐逆、顫掉、不省人事。若見鬼。循衣摸床。手足冷。脈伏。此胃中有結熱。故昏瞀不省人。以陽氣不能布於外。陰氣不持於內。卽顫掉而厥。遂與大承氣湯。至一劑。乃愈。方見仲景。後服金箔丸。方見刪繁。

有男子年六十一。脚腫生瘡。忽食猪肉。不安。醫以藥利之。稍愈。時出外。中風汗出後頭面暴腫起紫黑色多睡。耳輪上有浮泡小瘡。黃汁出。乃與小續命湯。中加羌活一倍。服之。遂愈。

有人年五十四。素羸多中寒。近服菟絲有效。小年常服生硫黃。數斤。脈左上二部。右下二部。弦緊有力。五七年來。病右手足筋急拘攣。言語稍遲。遂與仲景小續命湯。加薏苡仁一兩。以治筋急。減黃芩人參芍藥各半。以避中寒。杏仁只用一百五枚。後云尙覺大冷。因令盡去人參芍藥黃芩三物。却加當歸一兩半。遂安。今人用小續命湯者。比比皆是。既不能逐證加減。遂至危殆。人亦不知。今小續命湯。世所須也。故舉以爲例。可不謹哉。

夫八節之正氣。生活人者也。八節之虛邪。殺人者也。非正氣則爲邪。非眞實則爲虛。所謂正氣者。春溫、夏熱、秋涼、冬寒。此天之氣也。若春在經絡。夏在肌肉。秋在皮膚。冬在骨髓。此人之氣也。在處爲實。不在處爲虛。故曰若以身之虛。逢時之虛邪。不正之氣。兩虛相感。始以皮膚經絡。次傳至臟腑。逮於骨髓。則藥力難及矣。如此則醫家治病。正宜用藥抵截散補。防其深固而不可救也。又嘗須保護胃氣。舉斯爲例。餘可倣此。

本草衍義卷之四

【玉泉】經云。生藍田山谷。採無時。今藍田山谷無玉泉泉水。古今不言採。又曰服五斤。古今方。水不言斤。又曰一名玉札。如此則不知定是何物。諸家所解。更不言泉。但爲玉立文。陶隱居雖曰可消之爲水。故名玉泉。誠如是則當言玉水。亦不當言玉泉也。蓋泉具流布之義。別之則無所不通。易又曰。山下出泉蒙。如此則誠非止水絡未臻厥理。今詳泉字乃是漿字。於義方允。漿中既有玉。故曰服五斤。去古既遠。亦文字脫誤也。採玉爲漿。斷無疑焉。且如書篇尙多亡逸。況本草又在唐堯之上。理亦無怪。謂如虵含。本草誤爲虵全。唐本注云。全字乃是含字。陶見誤本改爲含。尙如化不定。後有鐵漿。其義同此。又道藏經。有金飴玉漿之文。唐李商隱有瓊漿未飮結成冰之詩。是知玉誠可以爲漿。又荆門軍界有玉泉寺。中有泉。與尋常泉水無異。亦不能治病。寺中日用此水。又西洛有萬安山。山腹間有寺曰玉泉。嘗兩登是山。有玉泉之疑。寺僧皆懵不能答。寺前有泉一派。供寺中用。泉竇皆青石。與諸井水無異。若按別本注。玉泉。玉之泉液也。以仙室玉池中者爲上。如此則舉世不能得。亦漫立此名。故知別本所注爲不可取。又有燕玉出燕北。體柔脆如油。和粉色不入藥。當附于此。

【丹砂】今人謂之朱砂。辰州朱砂。多出蠻峒。錦州界。猺獠峒。老鴉井。其井深廣數十丈。先聚薪于井。滿則縱火焚之。其青石壁迸裂處。卽有小竈。竈中自有白石床。其石如玉。床上乃生丹砂。小者如箭鏃。大者如

芙蓉其光明可鑒。研之鮮紅。砂泊床大者。重上八兩至十兩者。晁州亦有形如箭鏃帶石者。得自上中。非此之比。上此物鎮養心神。但宜生使煉服。少有不作疾者。亦不減硫黃輩。又一醫流服伏火者數粒。一旦大熱數夕而斃。李善勝嘗煉朱砂爲丹。經歲餘。沐浴再入鼎。誤遺不一塊。其徒丸服之。遂發憒冒。一夕而斃。其生朱砂。初生兒便可服。因火力所變。遂能殺人。可不謹也。

【空青】功長於治眼。仁廟朝。嘗詔御藥院。須中空有水者。將賜近戚。久而方得。其楊梅青。治翳極有功。中亦或有水者。其用與空青同。第有優劣耳。今信州穴山而取。世謂之楊梅青。極難得。

【綠青】即石碌是也。其石黑綠色者佳。大者刻爲物形。或作器用。又同硇砂。作吐風涎藥。驗則驗矣。亦攝心肺。

【雲母】古雖有服鍊法。今人服者至少。謹之至也。市廛多折花朵以售之。今惟合雲母膏。治一切癰毒瘡等。惠民局別有法。

【石鍾乳】蕭炳云。如蟬翼爪甲者爲上。如鵠管者下。經既言乳。今復不取乳。此何義也。蓋乳取其性下。不用如鴈齒者。謂如烏頭附子。不用尖角之義同。但明白光潤輕鬆。色如鍊消石者。佳。服鍊別有法。

【朴消】是初採掃得。一煎而成者。未經再鍊治。故曰朴消。其味酷澀。所以力堅急而不和。可以熟生牛馬皮。及治金銀有僞。葛洪治食鱠不化。取此以蕩逐之。臘月中出新瓦罐。滿注熟水。用朴消二升。投湯中。攪散。掛北簷下。俟消滲出罐外。羽收之。以人乳汁調半錢。掃一切風熱毒氣。攻注目臉外。及發於頭面四支

腫痛。應手神驗。

【芒消】經云生於朴消。乃是朴消以水淋汁。澄清。再經熬鍊減半。傾木盆中。經宿、遂結芒。有廉稜者。故其性和緩。古今多用以治傷寒。

【消石】是再煎鍊時。已取訖芒消。凝結在下如石者。精英既去。但餘滓而已。故功力亦緩。惟能發煙火。唐本注。蓋以能消化諸石。故名消石。煎柳枝湯煮三周時。卽伏火。湯耗。卽又添柳枝湯。

【芐消】是消之精英者。其味甘。卽馬牙消也。別有法鍊治而成。由其煎鍊。故其味亦別。治五藏積熱。然四物本出於一物。由此煎鍊。故分出精麁。所以其用亦不相遠。

【礬石】今坊州礬務。以野火燒過石。取以煎礬。色惟白。不逮晉州者。皆不可多服。損心肺。却水。故也。水化書紙上。纔乾。水不能濡。故知其性却水。治涎藥多須者。用此意爾。火枯爲粉。貼嵌甲牙縫中。血出如衄者。貼之亦愈。

【滑石】今謂之畫石。以其軟滑可寫畫。淋家多用。若暴得吐逆不下食。以生細末二錢匕。溫水服。仍急以熱麵半盞。押定。

【紫石英】明澈如水精。其色紫而不勻。張仲景治風熱奧瘙及驚癇奧瘙。風引湯。紫石英、白石英、寒水石、石膏、乾薑、大黃、龍齒、牡蠣、甘草、滑石、等分、混合咬五汝切。咀于與切。以水一升。煎去三分。食後量多少溫呷。不用滓服之無不效者。

【白石英】狀如紫石英但差大而六稜白色如水精紫白二石英當攻疾可暫煮汁用未聞久服之益張仲景之意只令咬咀不爲細末者豈無意焉其久服更宜詳審

【赤石脂】今四方皆有以舌試之黏着者爲佳有人病大腸寒滑小便精出諸熱藥服及一斗二升未甚效後有人教服赤石脂乾薑各一兩胡椒半兩同爲末醋糊丸如梧桐子大空心及飯前米飲下五七十丸終四劑遂愈

【白石脂】有初生未滿月小兒多啼叫致臍中血出以白石脂末貼之即愈未愈微微炒過放冷再貼仍不得剝揭

【石中黃子】此又字誤也子當作水況當條自言未成餘糧黃濁水焉得却名之子也若言未乾者亦不得謂之子也子字乃水字無疑又曰太一餘糧者則是兼石言之者也今醫家用石中黃只石中乾者及細末者即便是若用禹餘糧石即用其殼故本條言一名石腦須火燒醋淬如此即是石中黃水爲一等石中黃爲一等太一餘糧爲一等斷無疑焉

【婆娑石】今則轉爲磨娑石如淡色石綠間微有金星者佳磨之色如淡乳汁其味淡又有豆班石亦如此石但於石上有黑班點無金星

【無名異】今圖經曰本經云味甘平治金瘡折傷生肌肉今云味鹹寒消腫毒癰腫與本經所說不同疑別是一種今詳上文三十六字未審今云字下即不知是何處云也

【菩薩石】出峩嵋山中如水精明澈日中照出五色光如峩嵋普賢菩薩圓光因以名之今醫家鮮用

本草衍義卷之五

【金屑】不曰金而更加屑字者。是已經磨屑可用之義。如玉漿之義同。二經不解屑爲末盡。蓋須烹鍊鍛屑爲薄。方可研屑入藥。陶隱居云。凡用銀屑。以水銀和成泥。若非鍛屑成薄。焉能以水銀和成泥也。獨不言金屑。亦其闕也。生金有毒。至於殺人。仍爲難解。有中其毒者。惟鷓鴣肉可解。若不經鍛屑。則不可用。顆塊金卽穴山或至百十尺。見伴金石。其石褐色。一頭如火燒黑之狀。此定見金也。其金色深赤黃。麩金卽在江沙水中淘汰而得。其色淺黃。此等皆是生金也。得之皆當銷鍊。麩金耗折少。塊金耗折多。入藥當用塊金。色既深則金氣足。餘更防雜製成及點化者。如此。焉得更有造化之氣也。若本朝張永德字抱一。幷州人。五代爲潞帥。淸化二年改幷州。初寓睢陽。有書生鄰居臥病。永德療之。獲愈。生一日就永德求永伍兩。卽置鼎中。煮成中金。永德懇求藥法。生曰君當貴。吾不吝此。慮損君福。鍛工畢升言祥符年。嘗在禁中。爲方士王捷鍛金。以鐵爲金。凡百餘兩。爲一餅。輻解爲八段。謂之鴉背金。初自治中出。色尙黑。由是言之。如此之類。乃是水銀及鐵。用藥製成。非造化所成。功治焉得不差殊。如惠民局合紫雪用金。蓋假其自然金氣爾。然惡錫。又東南方金色深。西南方金色淡。亦土地所宜也。入藥故不如色深者。然得餘甘子。則體柔。亦相感。

【銀屑】金條中已解屑義。銀本出於礦。須煎鍊而成。故名熟銀。所以於後別立生銀條也。其用與熟銀大

同。世有術士。能以朱砂而成者。有鉛永而成者。有焦銅而成者。烏復更有造化之氣。豈可更入藥。既有此類。不可不區別。其生銀卽是不自礦中出。而特然自生者。又謂之老翁鬚。亦取像而言之耳。然銀屑經言有毒。生銀經言無毒。釋者漏略不言。蓋生銀已生發於外。無蘊鬱之氣。故無毒。礦銀尙蘊蓄於石中。鬱結之氣全未敷暢。故言有毒。亦惡錫。

【水銀】入藥雖各有法。極須審謹。有毒故也。婦人多服絕娠。今人治小兒驚熱涎潮。往往多用。經中無一字及此。亦宜詳諦。得鉛則凝。得硫黃則結。併棗肉研之則散。別法煅爲膩粉。粉霜、唾研。艷虱。粘得之則明。灌屍中則令尸後腐。以金銀銅鐵置其上則浮。得紫河車則伏。唐韓愈云太學博士李千遇。信安人。方士柳貴。能燒水銀爲不死藥。以鉛滿一鼎。按中爲空。實以水銀。蓋封四際。燒爲丹砂。服之下血。比四年病益急。乃死。余不知服食說自何世起。殺人不可計。而世慕尙之益至。此其惑也。在文書所記。及耳聞傳者不說。今亦取目見。親與之游。而以藥敗者六七公。以爲世誡。工部尙書歸登自說。既服水銀。得病。若有燒鐵杖自臍貫其下。摧而爲火。射竅節以出。狂痛、號呼乞絕。其苗蔕得水銀。發且止。唾血十數年。以艷殿中御史李虛中疽發其背。死。刑部尙書李遜謂余曰。我爲藥誤。遂死。刑部侍郎李建。一旦無病死。工部尙書孟簡邀我於萬州屏人曰。我得秘藥。不可獨不死。今遺子一器。可用棗肉爲丸服之。別一年而病。後有人至。訊之。曰。前所服藥誤。方且下之。下則平矣。病二歲。卒。東川節度御史大夫盧坦。溺血肉痛不可忍。乞死。金吾將軍李道古以柳貴得罪。食貴藥五十。死。海上。此可爲誡者也。顚不死。乃速得死。謂之智可不可也。五

穀三牲。鱗醯果蔬。人所常御。人相厚勉。必曰強食。今惑者皆曰五穀令人夭。當務減節。臨死乃悔。嗚呼哀也已。今有水銀燒成丹砂。醫人不曉。研爲藥衣。或入藥中。豈不違誤。可不謹哉。

【水銀粉】下涎藥。幷小兒涎潮瘈瘲多用。然不可常服。及過多。多則其損兼行。若兼驚。則尤須審謹。蓋驚爲心氣不足。不可下。下之裏虛。驚氣入心。不可治。若其人本虛。便須禁此一物。謹之至也。

【雄黃】非金苗。今有金窟處。無雄黃。金條中。言金之所生處處皆有雄黃。豈處處皆得也。別法。治蛇蛟。焚之燻蛇遠去。又武都者。鐫磨成物形。終不免其臭。唐甄立言仕爲太常丞。有道人病心腹懣煩。彌二歲。診曰腹有蟲。誤食髮而然。令餌雄黃一劑。少選。吐一蛇如拇。無目。燒之有髮氣。乃愈。此殺毒蟲之驗也。

【雌黃】入藥最稀。服石者宜審諦。治外功多。方士點化術多用。亦未聞其終始如何。畫工或用之。

【石硫黃】今人用治下元虛冷。元氣將絕。久患寒泄。脾胃虛弱。垂命欲盡。服之無不効。中病當便已。不可盡劑。世人蓋知用而爲福。不知用久爲禍。此物損益兼行。若俱弃而不用。當倉卒之間。又可闕乎。或更以法製。拒火而又常服者。是亦弗思也。在本朝則不言如此服良。但專治婦人。不知者往往更以酒服。其可得乎。或臟中久冷。服之先利。如病勢危急。可加丸數服。少則不効。仍加附子乾薑桂。

【陽起石】如狼牙者佳。其外色不白。如薑石。其大塊者。亦內白。治男子婦人下部虛冷。腎氣乏絕。子藏久寒。須水飛研用。凡石藥冷熱皆有毒。正宜斟酌。

【飛水石】又謂之寒水石。紋理細徹。人或磨刻爲枕。以備暑月之用。入藥須燒過。或市人燒入膩粉中以

亂眞。不可不察也。陶隱居言夏月能爲冰者佳。如此則舉世不能得。似乎失言。

【石膏】二書分辨不決。未悉厥理。詳本經。元無方解石之說。正緣唐本注石膏方解石。大體相似。因此一說。後人遂惑。經曰。生齊山山谷。及齊盧山。魯蒙山。採無時。卽知他處者爲非。今圖經中又以汾州者編入。前後人都不詳經中所言。細理白澤者良。故知不如是。則非石膏也。下有理石條中。經云。如石膏順理而細。又可明矣。今之所言。石膏方解石。二者何等有順理細文。又白澤者。有是。則石膏也。無是。則非石膏也。仍須是經中所言州土者。方可入藥。餘皆偏見。可略不取。仲景白虎湯中。服之如神。新校正仲景傷寒論後。言四月已後。天氣熱時。用白虎者是也。然四方氣候不齊。又歲中氣運不一。方所既異。雖其說甚雅。當此之時。亦宜兩審。若傷寒熱病。或大汗後。脈洪大。口舌燥。頭痛。大渴不已。或着暑熱。身痛倦怠。白虎湯服之無不効。

【磁石】色輕紫。石上輝澁。可吸連針鐵。俗謂之熁鐵石。養益腎氣。補填精髓。腎虛耳聾目昏。皆用之。入藥。須燒赤醋焠。其玄石。卽磁石之黑色者也。多滑淨。其治體大同小異。不可不分而爲二也。磨針鋒則能指南。然常偏東。不全南也。其法取新纊中獨縷。以半芥子許蠟。綴于針上。無風處垂之。則針常指南。以針橫貫燈心浮水上。亦指南。然常偏丙位。蓋丙爲大火。庚辛金受其制。故如是。物理相感耳。

【理石】如長石。但理石如石膏。順理而細。其非順理而細者爲長石。治療亦不相遼。

鐵礦。於礦中鍊出者。謂之【生鐵】。【鐵落】。斷而落者也。【鑐鐵】。鐵炒熟鐵也。【剛鐵】。【鍊鐵】。去滓者也。

【鐵精】【針沙】【鐵漿】已上上等。取汁各依經用。【鐵華粉】【鐵粉】已上二等。燒煅取。【馬啣】【秤錘】【車轄】【杵鋸】已上五等。特以其意使之耳。其生鐵既自火中煉石而出。世謂之生鐵。亦如炒脂麻取油。謂之生油。其義亦同。白油麻條中已著鐵粉。以生薑汁調擦眉上。牛眉毛鋼鐵。今用柔鐵。出盤。乃以生鐵陷其間。泥封煉之。鍛令相入。謂之團鋼。又曰灌鋼。此蓋草創之鋼。亦不免僞也。蓋生鐵之堅及三四鍊。則生鐵亦自熟。却是柔鐵。而天下莫以爲非。磁州鍊坊方識眞鋼。凡鐵之有鋼。如麵之有筋。漉洗揉麵既盡。筋乃見。鍊鋼亦然。恒取精鐵一百餘斤。每鍛一火。稱之。遂輕。累鍛稱之。至於不減耗。此則純鋼也。實鐵之精純者。雖百鍊不耗矣。其色清明。磨瑩之。則黯黯而清。且黑。亦有鍊之盡。全無鋼者。繫地之所產。精粗爾。前所謂鐵精者。其說有二。陶隱居言出鍛竈中。如塵紫色輕者爲佳。亦以磨瑩銅器用之。日華子又云。犂鐶尖浸水。名爲鐵精。本條既言化銅。則隱居所說是。蓋鍛竈中塵紫。磨銅。則明浸犂鐶尖水。非是。

【食鹽】素問曰。鹹走血。故東方食魚鹽之人多黑色。走血之驗。故可知矣。病嗽及水者宜全禁之。北狄用以淹尸。取其不壞也。至今如此。若中蚯蚓毒。常以鹽洗沃。亦宜湯化飲汁。其燒剉金銀鎔汁作藥。仍須解州池鹽爲佳。齒縫中多血出。常以鹽湯嗽。卽已。益齒走血之驗也。

【太陰玄精石】合他藥塗大風疾。別有法。陰發傷寒。指甲面色青黑。六脈沉細而疾。心下脹滿、結硬、躁渴。虛汗不止。或時狂言。四支逆冷。咽喉不利。腹疼。亦須佐他藥兼之。圖經本草已有法。惟出解州者良。

【蜜蛇僧】堅重。椎破如金色者佳。

【桃花石】有赤白兩等。有赤地淡白點如桃花片者。有淡白地有淡赤點如桃花片者。人往往鐫磨爲器用。今人亦罕服食。

【花乳石】其色如硫黃。本經第五卷中已著。今出陝華間。於黃石中間有淡白點。以此得花之名。今惠民局花乳石散者是。此物陝人又能鐫爲器。圖經第二卷中易其名爲花藥石。是却取其色黃也。更無花乳之名。慮歲久爲世所惑。故書之。

【珊瑚】治腎目。今人用爲點眼筋。有一等紅油色。有細縱紋可愛。又一種如鉛丹色。無縱紋爲下。入藥用紅油色者。嘗見一本高尺許。兩枝直上。分十餘歧。將至其顛。則交合連理。仍紅潤有縱紋。亦一異也。波斯國海中有珊瑚洲。海人乘大舶墮鐵網水底。珊瑚所生磐石上。白如菌。一歲而黃。三歲赤枝幹交錯。高三四尺。鐵發其根。繫網舶上。絞而出之。失時不取則腐。

【馬腦】非石非玉。自是一類。有紅白黑色三種。亦有其紋如纏絲者。出西裔者佳。彼土人以小者碾爲好玩之物。大者碾爲器。今古方入藥。絕可用此物。西方甚重。故佛經多言之。其馬口吐出。既知謬言。不合編入。

【石花】白色圓如覆大馬杓。上有百十枝。每枝各槎牙分歧。如鹿角。上有細文起。以指撩之。錚錚然有聲。此石花也。多生海中石上。世方難得。家中自有一本。後又於大相國宮中見一本。然其體甚脆。不禁觸擊。本條所注皆非是。

【石蟹】直是今之生蟹。更無異處。但有泥與麤石相着。凡用。須去其泥幷麤石。止用蟹。磨合他藥點目中。須水飛。

【石虵】本經不收。始自開寶本草。添附。其色如古墻上土。盤結如楂梨大。中空。兩頭巨細一等。無蓋。不與石蟹同類。蟹則眞蟹也。虵非眞虵。今人用之絕少。

本草衍義卷之六

【青琅玕】書曰三危既宅。三危。西裔之山也。厥貢惟球琳琅玕。孔頴達以謂琅玕石似玉。新書亦謂三苗西戎。西域記云。天竺國。正出此物。陶隱居謂爲未名大丹名。既是大丹名。則本經豈可更言煑煉服之。又曰可化爲丹。陶不合遠引非此琅玕也。唐本注云。是瑠璃之類。且瑠璃火成之物。琅玕又非火成。經曰生蜀郡平澤。安得同類言之。其說愈遠。且佛經所謂瑠璃者。正如鬼谷珠之礬。乃火成之物也。今人絕不見用。

【礬石】并【特生礬石】博物志及陶隱居皆言此二石。鸛取之以壅卵。如此則是一物也。隱居又言。仙經不云特生。則止是前白礬石。今補注但隨文解義。不見特生之意。蓋二條止是一物。但以特生不特生爲異耳。所謂特生者。不附著他石爲特耳。今用者絕少。惟兩字礬石入藥。然極須謹用。其毒至甚。及至論鸛巢中者。又却從謬說。鸛巢中皆無此石。乃曰鸛常入水冷。故取以壅卵。如此則鸕鷀鷹鸇之類。皆食於水。亦自繁息生化。復不用此二石。其說往往取俗士之言。未嘗究其實而窮其理也。嘗官於順安軍。親檢鸛巢。率無石。矧礬石焉得處處有之。然治久積及久病胸腹冷有功。直須謹用。蓋其毒不可當。

【代赭】方士爐火中多用。丁頭光澤堅實。赤紫色者佳。【白堊】即白善土。京師謂之白土子。方寸許切成段。鬻於市。人得以浣衣。今人合王瓜、等分爲末。湯點二錢服。治頭痛。【赤土】今公府用以飾椽柱者。水調

細末一二錢服。以治風瘧。

【大鹽】新者不苦。久則鹹苦。今解州鹽池所出者。皆成斗子。其形大小不等。久亦苦。海水煎成者。但味和二鹽互有得失。入藥及金銀作多用大鹽。及解鹽。傍海之人多黑色。蓋日食魚鹽。此走血之驗也。齒縫中血出。鹽湯漱之。及接藥入腎。北虜以鹽淹尸使不腐。

【戎鹽】成塊。裁之如枕。細白。味甘鹹。亦功在却血入腎。治目中瘀赤澁昏。

【鉛丹】本謂之黃丹。化鉛而成。別有法。唐本注。炒錫作。然經稱鉛丹。則炒錫之說誤矣。亦不爲難辨。蓋錫則色黯暗。鉛則明白。以此爲異。治瘧及久積皆用。

【粉錫】胡粉也。又名定粉。止泄痢積聚。及久痢。

【鉛霜】圖經已著其法。治上膈熱涎塞。塗木瓜失酸味。金尅木也。

【古文錢】古銅焦赤有毒。治目中瘴瘀。腐蝕壞肉。婦人橫逆產。五淋。多用。非特爲有錫也。此說非是。今但取景王時。大泉五十、及寶貨。秦半兩、漢莢錢。大小五銖、吳大泉五百、大泉當千、宋四銖二銖、及梁四柱、北齊、常平五銖。爾後其品尙多。如此之類方可用。少時常自患暴赤目腫痛。數日不能開。客有教以生薑一塊。洗淨去皮。以古青銅錢。刮取薑汁。就錢稜上點。初甚苦熱。淚蔑面。然終無損。後有患者。教如此點。往往疑惑。信士點之。無不獲驗。一點遂愈。更不可再作。有瘡者不可用。

【金牙】今方家絕不用。以此故。商客無利不販賣。醫者由是委而不用。兼所出惟蜀郡有之。蓋亦不廣也。

餘如經.

【石灰】水調一盞.如稠粥.揀好糯米粒全者.半置灰中.半灰外.經宿.灰中米色變如水精.若人手面上有黑黡子及紋刺.先微微以針頭撥動.置少許如水精者於其上.經半日許.黡汁自出.剔去藥不用.且不得着水.三二日愈.又取新硬石灰一合.以醋炒.調如泥.於患偏風.牽口喎邪.人口唇上不患處.一邊塗之.立便牽正.

【冬灰】諸家止解灰而不解冬.亦其闕也.諸灰一烘而成.惟冬灰則經三四月方徹爐.灰既曉夕燒灼.其力得不全燥烈乎.而又體益重.今一蒸而成者體輕.蓋火力劣.故不及冬灰耳.若舌緊面少容.方中用九燒益母灰.蓋取此義.如或諸方中用桑灰.自合依本法.既用冬灰.則須爾.唐本注云.冬灰本是棗灰.未知別有何說.又湯火灼.以餅爐中灰細羅.脂麻油調.羽掃.不得着水.仍避風.

【伏龍肝】婦人血露.蠶沙一兩.炒伏龍肝半兩.阿膠一兩.同爲末.溫酒調.空肚服二三錢.以知爲度.本條中有東壁土.陳藏器云.取其東壁土.久乾也.今詳之.南壁土.亦向陽久乾也.何不取.蓋東壁常先得曉日烘炙.日者太陽眞火.故治瘟瘧.或曰何不取午盛之時南壁土.而取日初出東壁土者.何也.火生之時.其氣壯.故素問云.少火之氣壯.及其當午之時.則壯火之氣衰.故不取.實用此義.或曰何以知日者太陽眞火.以水精珠.或心凹銅鑑.向日射之.以艾承接其光聚處.火出.故知之.

【半天河水】一水也.然用水之義有數種.種各有理.如半天河水.在上天澤水也.故治心病、鬼疰、狂、邪氣

惡毒【臘雪水】大寒水也。故解一切毒。治天行時氣溫疫、熱癇、丹石發、酒後暴熱、黃疸【井華水】清冷澄澈水也。故通九竅。洗目膚瞤。及酒後熱痢。後世又用【東流水】者。取其泝順疾速。通關下鬲者也。【倒流水】取其回旋留止。上而不下者也。

【菊花水】本條見南陽酈縣北潭水。其源悉芳。菊生被崖。水爲菊味。此說甚怪。且菊生於浮土上。根深者不過尺。百花之中。此特淺露。水泉莫非深遠而來。況菊根亦無香。其花當九月十月間。止三兩旬中。焉得香入水也。若因花而香。其無花之月。合如何也。殊不詳。水自有甘淡鹹苦。焉知無有菊味者。嘗官於永耀間。沿幹至洪門北山下。古石渠中。泉水清徹。衆官酌而飲。其味與惠山泉水等。亦微香。世皆未知之。烹茶無相宜。由是知泉脈如此。非緣浮土上所生菊。能變泉味。博識之士。宜細詳之。

【漿水】不可同李實飲。令人霍亂吐利。

【熱湯】助陽氣行經絡。患風冷氣痺人。多以湯漬脚至膝上。厚覆使汗出周身。然別有藥。亦終假湯氣血行也。四時暴泄利。四支冷。臍腹疼。深湯中坐。浸至腹上。頻頻作生陽佐藥無速於此。虛寒人始坐湯中。必戰。仍常令人伺守。

【砒砂】金銀有僞。投鎔鍋中。其僞物盡消散。矧人腹中有久積。故可潰腐也。合他藥治目中瞖。用之須水飛過。入甕器中。於重湯中煮其器。使自乾。殺其毒。及去其塵穢。

【蓬砂】唅化嚥津。治喉中腫痛。鬲上痰熱。初覺便治。不能成喉痺。亦緩取効可也。南番者色重褐。其味和。

其效速西戎者其色白其味燋其功緩亦不堪作鉼

【盞石】所在皆有須不見日色旋取微白者佳治丁腫殊效

【自然銅】有人飼折翅鴈後遂飛去今人打撲損研極細水飛過同當歸沒藥各半錢以酒調頻服仍以手摩痛處

【石鸐】今人用者如蜆蛤之狀色如土堅重則石也既無羽翼焉能自石穴中飛出何故只墮沙灘上此說近妄唐本注永州土崗上掘深丈餘取之形如蚶而小重如石則此自是一物餘說不可取潰虛積藥中多用

【砒霜】瘡家或用纔過劑則吐瀉兼作須濃研菉豆汁仍兼冷水飲得石腦油卽伏今信州鉛坑井下取之其坑常封鎖坑中有濁綠水先絞水盡然後下鑿取生砒謂之砒黃其色如牛肉或有淡白路謂石非石謂土非土磨研酒飲治癖積氣有功纔見火便有毒不可造次服也取砒之法將生砒就置火上以器覆之令砒烟上飛着覆器遂凝結鱗然下垂如乳尖長者爲勝平短者次之圖經言大塊者其大塊者已是下等片如細屑者極下也入藥當用如乳尖長者直須詳謹

【浮石】水飛治目中瞖今皮作家用之磨皮上垢無出此石石蟹條中云浮石平無毒止渴治淋殺野獸毒合於此條收入

【金星石】【銀星石】治大風疾別有法預燒用金星石於蒼石內外有金色麩片銀星石有如銀色麩片

又一種深青色堅潤中有金色如戔片不入藥工人碾爲器或婦人首飾餘如經【石腦油】眞者難收多滲蝕器物今入藥最少燒煉或須也仍常用有油去聲器貯之又研生砒霜入石腦油再研如膏入砒鍋子內用淨瓦片子蓋定置火上俟鍋子紅粒盡油出之又再研再入油再上火凡如此共兩次卽砒霜伏

本草衍義卷之七

【赤箭】天麻苗也。然與天麻治療不同。故後人分之爲二。經中言八月採根曝乾。故知此卽苗也。

【天門冬】麥門冬之類。雖曰去心。但以水漬漉。使周潤。滲入肌俟軟緩擘取。不可浸出脂液。其不知者。乃以湯浸一二時。柔卽柔矣。然氣味都盡。用之不效。乃曰藥不神。其可得乎。治肺熱之功爲多。其味苦。但專泄而不專收。寒多人禁服。餘如二經。

【麥門冬】根上子也。治心肺虛熱。幷虛勞客熱。亦可取苗作熟水飲。

【蒼朮】其長如大拇指。肥實。皮色褐。氣味辛烈。須米泔浸洗。再換泔浸二日。去上麁皮。【白朮】麁促。色微褐。氣味亦微辛。苦而不烈。古方及本經止言朮。未見分其蒼白二種也。只緣陶隱居言朮有兩種。自此人多貴白者。今人但貴其難得。惟用白者。往往將蒼朮置而不用。如古方平胃散之類。蒼朮爲最要藥。功尤速。殊不詳本草元無白朮之名。近世多用。亦宜兩審。嵇康曰。聞道人遺言。餌朮黃精。令人久壽。亦無白字。

【地黃】葉如甘露子花。如脂麻花。但有細斑點。北人謂之牛妳子花。莖有微細短白毛。經只言乾生二種。不言熟者。如血虛勞熱。產後虛熱。老人中虛燥熱。須地黃者。生與生乾常慮大寒。如此之類。故後世改用熟者。蒸曝之法。以細碎者洗出研取汁。將麁地黃蒸出曝乾。投汁中。浸三二時。又曝再蒸。如此再過爲勝。亦不必多。此等名乾生二種功治殊別。陶但云擣汁和蒸。殊用工意不顯。其法不注治療。故須悉言耳。

【菖蒲】世又謂之蘭蓀。生水次。失水則枯。根節密者。氣味足。有人患遍身生熱毒瘡。痛而不痤。手足尤甚。然至頸而止。粘着衣被。曉夕不得睡。痛不可任。有下俚教以菖蒲三斗。剉。日乾之。椿糴爲末。布蓆上。使病瘡人恣臥其間。仍以被衣覆之。既不粘着衣被。又復得睡。不五七日之間。其瘡如失。後自患此瘡。亦如此用。應手神驗。其石菖蒲。根絡石而生者。節乃密。入藥須此等。

【澤瀉】其功尤長於行水。張仲景曰。水搐渴煩。小便不利。或吐或瀉。五苓散主之。方用澤瀉。故知其用長於行水。本經又引扁鵲云。多服病人眼澀。誠爲行去其水。張仲景八味丸用之者。亦不過引接桂附等歸就腎經。別無他意。凡服澤瀉散人。未有不小便多者。小便既多。腎氣焉得復實。今人止洩精多不敢用。

【山藥】按本草上一字犯英廟諱。下一字曰薯。唐代宗名豫。故改下一字爲藥。今人遂呼爲山藥。如此則盡失當日本名。慮歲久。以山藥爲別物。故書之。此物貴生乾方入藥。其法。冬月以布裹手用竹刀子劃去皮。於屋簷下風逕處。盛竹篩中。不得見日色。一夕乾五分。俟全乾收之。惟風緊則乾速。所以用乾之意。蓋生濕則滑。不可入藥。熟則只堪啗。亦滯氣。餘如經。

【菊花】近世有二十餘種。惟單葉花小而黃綠葉色深小而薄。應候而開者。是也。月令所謂菊有黃華者也。又杭州白菊單葉者亦入藥。餘醫經不用。專治頭目風熱。今多收之作枕。

【甘草】枝葉悉如槐。高五六尺。但葉端微尖而糙澁。似有白毛。實作角。生如相思角作一本。生子如小扁豆。齒嚙不破。今出河東西界。入藥須微炙。不爾亦微涼。生則味不佳。

【人參】今之用者。皆河北摧場。博易到盡是高麗所出。率虛軟味薄。不若潞州上黨者。味厚體實。用之有據。土人得一窠。則置於版上。以色絲纏繫。根頗纖長。不與摧場者相類。根下垂有及一尺餘者。或十歧者。其價與銀等。稍爲難得。

【石斛】細若小草。長三四寸。柔韌。折之如肉而實。今人多以木斛渾行。醫工亦不能明辨。世又謂之金釵石斛。蓋後人取象而言之。然甚不經。將木斛折之。中虛如禾草。長尺餘。但色深黃光澤而已。眞石斛。治胃中虛熱有功。

【牛膝】今西京作畦種。有長三尺者。最佳。與蔥蓉浸酒服。益腎。竹木刺入肉。嚼爛罨之。卽出。

【細辛】用根。今惟華州者佳。柔韌。極細直。深紫色。味極辛。嚼之習習如椒。治頭面風痛。不可闕也。葉如葵葉。亦黑。非此則杜蘅也。杜蘅葉形如馬蹄下。故俗云馬蹄香。蓋根似白前。又似細辛。襄漢間一種細辛。極細而直。色黃白。乃是鬼督郵。不可用。

【茈胡】本經並無一字治勞。今人治勞方中。鮮有不用者。嗚呼。凡此誤世甚多。嘗原病勞。有一種眞藏虛損。復爲邪熱。邪因虛而致勞。故曰勞者牢也。當須斟酌用之。如經驗方中。治勞熱。青蒿煎丸。用茈胡正合宜。耳服之無不效。熱去卽須急已。若或無熱。得此愈甚。雖至死。人亦不怨。目擊甚多。日華子又謂補五勞七傷。藥性論亦謂治勞乏羸瘦。若此等病。苟無實熱。醫者執而用之。不死何待。注釋本草一字亦不可忽。蓋萬世之後。所誤無窮耳。苟有明哲之士。自可處治。中下之學。不肯考究。枉致淪沒。可不謹哉。可不戒哉。

如張仲景治寒熱往來如瘧狀。用柴胡湯正合其宜。

【薏苡仁】此李商隱太倉銘中所謂薏苡似珠不可不虞者也。取仁用。本經云。微寒。主筋急拘攣。拘攣有兩等。素問註中大筋受熱。則縮而短。縮短故攣急不伸。此是因熱而拘攣也。故可用薏苡仁。若素問言因寒。即筋急者。不可更用此也。凡用之須倍於他藥。此物力勢和緩。須倍加用。即見效。蓋受寒即止能人筋急。受熱。故使人筋攣。若但熱而不曾受。又亦能使人筋緩。受濕則又引長無力。

【車前】陶隱居云。其葉擣取汁服。療洩精大誤矣。此藥甘滑。利小便。走泄精氣。經云。主小便赤下氣。有人作菜食。小便不禁。幾爲所誤。

【芫蔚子】葉至初春。亦可煑作菜食。凌冬不凋悴。唐武后九燒此灰。入緊面藥。九燒之義。已具冬灰條中。

【木香】專泄決胸腹間滯塞冷氣。他則次之。得橘皮肉豆蔻生薑相佐使。絕佳。效尤速。又一種。嘗自岷州出塞。得生青木香。持歸西洛。葉如牛蒡。但狹長。莖高三四尺。花黃。一如金錢。其根則青木香也。生嚼之。極辛香。尤行氣。

【菟絲子】附叢木中。即便蔓延。花實無綠葉。此爲草中之異。其上有菟絲。下有茯苓之說。未必耳。已於茯苓條中具言之。

【巴戟天】本有心。乾縮時。偶自落。或可以抽摘。故中心或空。非自有小孔子也。今人欲要中間紫色。則多僞以大豆汁沃之。不可不察。外堅難染。故先從中間紫色。有人嗜酒。日須五七盃。後患脚氣甚危。或教以巴戟半兩。糯米同炒。米微轉色。不用米。大黃一兩。剉、炒、同爲末。熟蜜爲丸。溫水服五七十丸。仍禁酒。遂愈。

本草衍義卷之八

【肉蓯蓉】圖經以謂皮如松子有鱗子字當爲殼於義爲允又曰以酒淨洗去黑汁作羹黑汁既去氣味皆盡然嫩者方可作羹老者苦入藥少則不效

【蔌蓯】有兩等一等杜蔌蓯卽今之道傍布地而生或生墻上有小黃花結芒刺此正是墻有茨者花收摘蔭乾爲末每服三二錢餌後以溫酒調服治白癜風又一種白蔌蓯出同州沙苑牧馬處黃紫花作莢結子如羊內腎補腎藥今人多用風家惟用刺蔌蓯

【防風】【黃耆】世多相須而用唐許胤宗爲新蔡王外兵參軍王太后病風不能言脈沉難對醫告術窮胤宗曰餌液不可進卽以黃耆防風煮湯數十斛置床下氣如霧熏薄之是夕語

【千歲藁】唐開元末訪隱民姜撫已幾百歲召至集賢院言服常春藤使白髮還鬢則長生可致藤生太湖終南往往有之帝遣使多取以賜老臣詔天下使自求之擢撫銀青光祿大夫號冲和先生又言終南山有旱藕餌之延年狀類葛粉帝取之作湯餅賜大臣右驍騎將軍甘守誠曰常春者千歲藁也旱藕者杜蒙也方家久不用撫易名以神之民間以酒漬藤飲者多暴死乃止撫內慙請求藥牢山遂逃去今書之以備世疑

【黃連】今人多用治痢蓋執以苦燥之義下俚俗見腸虛滲泄微似有血便卽用之更不知止又不顧寒

熱多少但以盡劑爲度由是多致危困若氣實初病熱多血痢服之便止仍不必盡劑也或虛而冷則不須服餘如經

【藍實】即大藍實也謂之蓼藍非是爾雅所說是解諸藥等毒不可闕也實與葉兩用注不解實只解藍葉爲未盡經所說盡矣藍一本而有數色刮竹青綠雲碧青藍黃豈非青出於藍而青於藍者也生葉汁解藥毒此即大葉藍又非蓼藍也蓼藍即堪揉汁染翠碧花成長穗細小淺紅色

【景天】陶隱居既云今人皆盆盛養之於屋上即知是草藥又言廣州城外有一株云可三四圍呼爲愼火木既曰云即非親見也蓋是傳聞亦非誤耳乃陶之輕聽也然極易種但折生枝置土中頻澆溉旬日便下根濃研取汁塗火心瘡甚驗乾爲末水調掃游風赤瘡赬熱者

【蒲黃】處處有即蒲槌中黃粉也今京師謂槌爲蒲棒初得黃細羅取蕚別貯以備他用將蒲黃水調爲膏擘爲塊人多食之以解心臟虛熱小兒尤嗜涉月則燥色味皆淡須蜜水和然不可多食令人自利不益極虛人

【蘭草】諸家之說異同是曾未的識故無定論葉不香惟花香今江陵鼎澧州山谷之間頗有山外平田即無多生陰地生於幽谷益可驗矣葉如麥門冬而闊且韌長及一二尺四時常青花黃中間葉上有細紫點有春芳者爲春蘭色深秋芳者爲秋蘭色淡秋蘭稍難得二蘭移植小檻中置座右花開時滿室盡香與他花香又別唐白樂天有種蘭不種艾之詩正爲此蘭矣今未見用者未經蘇注八月花白此即澤

蘭也

【茵蔯蒿】張仲景治傷寒熱甚發黃者。身面悉黃。用之極效。又一僧因傷寒後發汗不澈。有留熱。身面皆黃。多熱期年不愈。醫作食黃治之。治不對病。不去。問之。食不減。尋與此藥。服五日。病減三分之一。十日減三分之二。二十日病悉去。方用山茵蔯、山梔子各三分。秦艽升麻各四錢。末之。每用三錢。水四合。煎及二合。去滓。食後溫服。以知爲度。然此藥以茵蔯蒿爲本故書之。

【決明子】苗高四五尺。春亦爲蔬。秋深結角。其子生角中。如羊腎。今湖南北人家園圃所種甚多。或在村野成叚種。蜀本圖經言。葉似苜蓿而闊大。甚爲允當。

【芎藭】今出川中。大塊。其裏色白。不油色。嚼之微辛甘者佳。他種不入藥。止可爲末。煎湯沐浴。此藥今人所用最多。頭面風不可闕也。然須以他藥佐之。沈括云。予一族子舊服芎藭。醫鄭叔熊見之云。芎藭不可久服。多令人暴死。後族子果無疾而卒。又朝士張子通之妻病腦風。服芎藭甚久。亦一旦暴亡。皆目見者。此蓋單服耳。若單服既久。則走散眞氣。既使他藥佐使。又不久服。中病便已。則烏能至此也。

【五味子】今華州之西。至秦州。皆有之。方紅熟時。採得。蒸爛。研濾汁。去子。熬成稀膏。量酸甘入蜜。再火上。待蜜熟。俟冷。器中貯。作湯。肺虛寒人。可化爲湯。時時服。作果。可以寄遠。本經言溫。今食之多致虛熱。小兒益甚。藥性論以謂除熱氣。日華子又謂暖水臟。又曰除煩熱。後學至此多惑。今既用之治肺虛寒。則更不取除煩熱之說。則下藥亦用之。入藥生曝不去子。

【旋花】蔓生。今之河北京西關陝田野中甚多。最難鋤艾治之又生。世又謂之鼓子花。言其形肖也。四五月開花。亦有多葉者。其根寸截置土下。頻灌溉。方涉旬。苗已生。蜀本圖經是矣。

本草衍義卷之九

【當歸】廣雅云山蘄古芹切當歸也似芹而麤大說文云蘄草也生山中者名藥音白新書圖經以謂當歸芹類也在平地者名芹生山中麤大者名當歸若然則今川蜀皆以平地作畦種尤肥好多脂肉不以平地山中爲等差但肥潤不枯燥者佳今醫家用此一種爲勝市人又以薄酒洒使肥潤不可不察也藥性論云補女子諸不足此說盡當歸之用矣

【芍藥】全用根其品亦多須用花紅而單葉山中者爲佳花葉多即根虛然其根多赤色其味澁若或有色白麤肥者益好餘如經然血虛寒人禁此一物古人有言曰減芍藥以避中寒誠不可忽

【生薑】治暴噎氣嚼三兩皂子大下嚥定屢服屢定初得寒熱痰嗽燒一塊冷嚼之終日間嗽自愈暴赤眼無瘡者以古銅錢刮淨薑上取汁於錢唇點目熱淚出今日點來日愈但小兒甚懼不須疑已試良驗

【麻黃】出鄭州者佳剪去節半兩以蜜一匙匕同炒良久以水半升煎俟沸去上沫再煎去三分之一不用滓病瘡疱倒髮黑者乘熱盡服之避風伺其瘡復出一法用無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然其効更速以此知此藥入表也

【葛根】漕鼎之間冬月取生葛以水中揉出粉澄成塊先煎湯使沸後擘成塊下湯中良久色如膠其體甚韌以蜜湯中拌食之擦少生薑尤佳大治中熱酒渴病多食行小便亦能使人利病酒及渴者得之甚

良。彼之人又切入煮茶中以待賓。但甘而無益。又將生葛根煮熟者。作果賣。虔吉州南安軍亦如此賣。

【栝樓實】九月十月間。取穰。以乾葛粉拌。焙乾。銀石器中。慢火炒熱爲末。食後夜臥。以沸湯點一二錢服。治肺燥熱渴。大腸秘。其根與貝母知母秦艽黃芩之類。皆治馬熱。

【苦參】有朝士苦腰重。久坐旅拒十餘步。然後能行。有一將佐謂朝士曰。見公日逐以藥揩齒。得無用苦參否。曰始以病齒。用苦參已數年。此病由苦參入齒。其氣味傷腎。故使人腰重。後有太常少卿舒昭亮。用苦參揩齒。歲久亦病腰。自後悉不用。腰疾皆愈。此皆方書舊不載者。有人病遍身風熱細瘡。痒痛不可任。連胸頸臍腹。及近隱處皆然。涎痰亦多。夜不得睡。以苦參末一兩。皂角二兩。水一升。揉濾取汁。銀石器熬成膏。和苦參末爲丸。如梧桐子大。食後溫水服二十至三十丸。次日便愈。

【石龍芮】今有兩種。水中生者。葉光而末圓。陸生者。葉有毛而末銳。入藥須生水者。陸生者又謂之天炙。取少葉揉繫臂上。一夜作大泡。如火燒者是。惟陸生者。補陰不足。蒸常冷。失精。餘如經。

【瞿麥】八政散用瞿麥。今人爲至要藥。若心經雖有熱。而小腸虛者。服之則心熱未退。而小腸別作病矣。料其意者不過爲心與小腸爲傳送。故用此入小腸藥。按經。瞿麥並不治心熱。若心無大熱。則當止治其心。若或制之不盡。須當求其屬以衰之。用八政散者。其意如此。

【白芷】葖是也。出吳地者良。經曰。能蝕膿。今人用治帶下。腸有敗膿。淋露不已。腥穢殊甚。遂至臍腹更增冷痛。此蓋爲敗膿血所致。卒無已期。須以此排膿。白芷一兩。單葉紅蜀葵根二兩。芍藥根白者。白礬各半

兩。攀燒枯別研。餘爲末。同以蠟丸如梧子大。空肚及餓前。米飲下十丸或十五丸。俟膿盡。仍別以他藥補之。

【杜蘅】用根似細辛。但根色白。葉如馬蹄之下。市者往往亂細辛。須如此別之。爾雅以謂似葵而香。是也。將杜蘅與細辛相對。便見眞僞。況細辛惟出華州者良。杜蘅其色黃白。拳局而脆。乾則作團。

【紫菀】用根。其根柔細紫色。益肺氣。經具言之。唐本注言無紫菀時。亦用白菀。白菀卽女菀也。今本草無白菀之名。蓋唐修本草時。已删去。

【百合】張仲景用治傷寒壞後百合病。須此也。莖高三尺許。葉如大柳葉。四向攢枝而上。其顚卽有淡黃四花。四垂向下。覆長蘂。花心有檀色。每一枝顚。須五六花。子紫色。圓如梧子。生於枝葉間。每葉一子。不在花中。此又異也。根卽百合。其色白。其形如松子殼。四向攢生。中間出苗。

【酸漿】今天下皆有之。苗如天茄子。開小白花。結青殼。熟則深紅。殼中子大如櫻。亦紅色。櫻中復有細子。如落蘇之子。食之有青草氣。此卽苦虖也。今圖經又立苦虖條。顯然重復。本經無苦虖。

【蠡實】陶隱居云方藥不復用。俗無識者。本經諸家所注不相應。若果是馬蘭。則日華子不當更言。亦可爲蔬菜食。蓋馬蘭其葉馬牛皆不食。爲纔出土葉已硬。況又無味。豈可更堪人食也。今不敢以蠡實爲馬蘭子。更俟博識者。

【石香菜】處處有之。不必山巖石縫中。但山中臨水附崖處。或有之。九月十月尙有花。

本草衍義卷之十

【款冬花】百草中惟此不顧冰雪最先春也世又謂之鑽凍雖在冰雪之下至時亦生芽春時人或採以代蔬入藥須微見花者良如已芬芳則都無力也今人又多使如筯頭者恐未有花爾有人病嗽多日或教以然款冬花三兩枚於無風處以筆管吸其煙滿口則嚥之數日効

【牡丹】用其根上皮花亦有緋者如西洛潛溪緋是也今禁苑又有深碧色者惟山中單葉花紅者爲佳家椑子次之若移枝接者不堪用爲其花葉既多發奪根之氣也何以知之今千葉牡丹初春留花稍多來年花枝幷葉便瘦多是開不成市人或以枝梗皮售於人其乖殊甚

【女苑】一名白苑或者謂爲二物非也唐刪去白苑之條甚合宜陶能言不能指說性狀餘從經中所說甚明今直取經

【澤蘭】按補注云葉如蘭今蘭葉如麥門冬稍闊而長及一二尺無枝梗殊不與澤蘭相似澤蘭纔出土便分枝梗葉如菊但尖長若取其香嗅則稍相類既謂之澤蘭又曰生汝南大澤傍則其種本別如蘭之說誤矣

【地楡】性沉寒入下焦熱血痢則可用若虛寒人及水瀉白痢即未可輕使

【白前】保定肺氣治嗽多用白而長於細辛但麤而脆不似細辛之柔以溫藥相佐使則尤佳餘如經

【土瓜】體如栝樓。其殼徑寸。一種長二寸許。上微圓。下尖長。七八月間熟。紅赤色。殼中子如螳螂頭者。今人又謂之赤雹子。其根卽土瓜根也。於細根上又生淡黃根。三五相連。如大指許。根與子兩用。紅子同白土子治頭風。

【薺苨】今陝州採爲脯。別有法。甚甘美。兼可寄遠。古人以謂薺苨似人參者是。此解藥毒甚驗。

【積雪草】今南方多有。生陰濕地。不必荆楚。形如水荇而小。面亦光潔。微尖爲異。今人謂之連錢草。蓋取象也。葉葉各生。搗爛貼一切熱毒癰疽等。秋後收之。蔭乾爲末。水調。

【涉草】其根上如棗核者。又謂之香附子。亦入印香中。亦能走氣。今人多用。雖生於涉草根。然根上或有或無。有薄皺皮紫黑色。非多毛也。刮去皮。則色白。若便以根爲之。則誤矣。其味苦。

【惡實】是子也。今謂之牛蒡。未去蓴時。又謂之鼠粘子。根謂之牛蒡。疎風壅涎唾多。咽喉不利。微炒同入荆芥穗各一兩。甘草炙半兩。併爲末。食後夜臥。湯點二錢服。當緩取效。子在蓴中。蓴上有細鈎。多至百十。謂之芒。則誤矣。根長一二尺。麤如拇指。煮爛爲菜。

【大小薊】皆相似。花如髻。但大薊高三二尺。葉皺。小薊高一尺許。葉不皺。以此爲異。小薊山野人取爲蔬。甚適用。雖有微芒。亦不能害人。

【艾葉】乾搗篩去青滓。取白入石硫黃。爲硫黃艾。炙家用。得米粉少許。可搗爲末。入服食藥。入硫黃別有法。

【陟釐】今人事治音池爲苦脯堪嗜。京城市者甚多。然治渴疾。仍須禁食鹽。餘方家亦罕用。

【菟葵】綠葉如黃蜀葵。花似拗霜甚雅。形如至小者。初開單葉蜀葵有檳心。色如牡丹姚黃藥。則蜀葵也。唐劉夢得還京云。唯菟葵燕麥動搖春風者是也。

【白藥】今爲治馬肺熱藥有效。

【薤香子】今人止呼爲茴香。治膀胱冷氣及瘴痛。亦調和胃氣。唐本注似老胡荽。此誤矣。胡荽葉如虵床。薤香徒有葉之名。但散如絲髮。特異諸草。枝上時有大青蟲。形如蠶。治小腸氣甚良。

【鬱金】不香。今人將染婦人衣最鮮明。然不奈日炙。染成衣。則微有鬱金之氣。

【肉豆蔻】對草荳蔻言之。去殼。只用肉。肉油色者佳。枯白。味薄瘦虛者下等。亦善下氣。多服則泄氣。得中則和來其氣。

【茅香】花白。根如茅。但明潔而長。皆可作浴湯。同藁本尤佳。仍入印香中。合香附子用。

【青黛】乃藍爲之。有一婦人患臍下腹上下連二陰。遍滿生濕瘡。壯如馬瓜瘡。他處並無。熱痒而痛。大小便澀出黃汁。食亦減。身面微腫。醫作惡瘡治。用鰻鯉魚。松脂。黃丹之類。藥塗上。瘡愈熱痛愈甚。治不對。故如此。問之。此人嗜酒。貪啗。喜魚蟹發風等物。急令用溫水洗。拭去膏藥。尋以馬齒莧四兩。爛研細。入青黛一兩。再研勻塗瘡上。即時熱減。痛痒皆去。仍服八政散。日三服。分散客熱。每塗藥。得一時久。藥已乾燥。又再塗新濕藥。凡如此及日減三分之一。五日減三分之二。自此二十日愈。既愈而問曰。此瘡何緣至此。曰

中下焦蓄風熱毒氣若不出當作腸癰內痔仍常須禁酒及發風物然不能禁酒後果然患內痔

【零陵香】至枯乾猶香入藥絕可用婦人浸油飾髮香無以加此即薰草是也

【天麻】用根須別藥相佐使然後見其功仍須加而用之人或蜜漬爲果或蒸煮食用天麻者深思之則得矣苗則赤箭也

【蕃撥】走腸胃中冷氣嘔吐心腹滿痛多服走泄眞氣令人腸虛下重

【使君子】紫黑色四稜高瓣深今經中謂之稜瓣深似令人難解秋末冬初人將入鼎澧其仁味如椰子肉經不言用仁爲復用皮今按文味甘即是用肉然難得仁蓋絕小今醫家或兼用殼

【蜜蒙花】利州路甚多葉冬亦不凋然不似冬青蓋柔而不光潔不深綠花細碎數十房成一朵冬生春開此木也今居草部恐未盡善

本草衍義卷之十一

【大黃】損益前書已具。仲景治心氣不足。吐血衄血瀉心湯用大黃黃芩黃連。或曰心氣既不足矣。而不用補心湯。更用瀉心湯何也。答曰若心氣獨不足。則不當須吐衄也。此乃邪熱因不足而客之。故吐衄以苦泄其熱。就以苦補其心。蓋兩全之。有是證者用之無不效。量虛實用藥。

【桔梗】治肺熱氣奔促。嗽逆肺癰。排膿。陶隱居云。俗方用此乃名薺苨。今別有薺苨。所謂亂人參者便是。非此桔梗也。唐本注云。陶引薺苨亂人參謬矣。今詳之。非也。隱居所言。其意止以根香之。所以言亂人參。唐本注卻以苗難之。乃本注誤矣。

【甘遂】今惟用連珠者。然經中不言。此藥專於行水。攻決爲用。入藥須斟酌。

【葶藶】用子。子之味有甜苦兩等。其形則一也。經既言味辛苦。卽甜者不復更入藥也。大槩治體皆以行水走泄爲用。故曰久服令人虛。蓋取苦泄之義。其理甚明。藥性論所說盡矣。但不當言味酸。

【蕘花】今京洛間甚多。張仲景傷寒論以蕘花治利者。以其行水也。水去則利止。其意如此。然今人用時。當以意斟酌。不可使過與不及也。仍須是有是證者方可用。

【旋復花】葉如大菊。又如艾蒿。八九月有花。大如梧桐子。花淡黃綠繁茂圓而覆下。亦一異也。其香過於菊。行痰水。去頭目風。其味甘苦辛。亦走散之藥也。其旋花四月五月有花。別一種。非此花也。第八卷已具。

【藜蘆】爲末。細調。治馬疥瘁。

【烏頭】【烏喙】【天雄】【附子】【側子】凡五等。皆一物也。止以大小長短似像而名之。後世補虛寒。則須用附子。仍取其端平而圓大及半兩以上者。其力全。不僭。風家卽多用天雄。亦取其大者。以其尖角多熱性。不肯就下。故取散也。此用烏頭附子之大略如此。餘三等。則量其材而用之。其炮製之法。經方已著。

【射干】此乃荀子所說西方之木。名曰射干者也。注復引本草曰。不合以射干爲木。殊不知五行止以水火木金土而言之。故儒者以草木皆木也。金鈆皆金也。糞土皆土也。灰火皆火也。水池皆水也。由是言之。卽非佛經所說火宅喻之獸。及阮公所云臨層城者之木。況本經亦曰一名草蠆。故知是草無疑。今治肺氣喉痺爲佳。日華子曰。大小似高良薑。赤黃色。此得之。

【半夏】今人惟知去痰。不言益脾。蓋能分水故也。脾惡濕。濕則濡而困。困則不能制水。經曰濕勝則瀉。一男子夜數如廁。或教以生薑一兩碎之。半夏湯洗。與大棗各三十枚。水一升。瓷瓶中慢火燒爲熟水。時時呷。數日便已。

【蜀漆】常山苗也。治瘧多吐人。其他亦未見所長。此草也。慮歲久。人或別有異論。故預云。餘如經。

【常山】蜀漆根也。亦治瘧吐痰。如雞骨者佳。

【青箱子】經中並不言治眼。藥性論始言之。能治肝臟熱毒衝眼、赤障、青盲。蕭炳可云、理眼。日華子云、益腦髓。明耳目。鎭肝。今人多用之治眼。殊不與經意相當。

【白蘞】【白及】古今服餌方少有用者多見於斂瘡方中二物多相須而行

【草蒿】今青蒿也在處有之得春最早人剔以爲蔬根赤葉香今人謂之青蒿亦有所別也但一類之中又取其青者陝西綏銀之間有青蒿在蒿叢之間時有一兩窠逈然青色土人謂之爲香蒿莖葉與常蒿一同但常蒿色淡青此蒿色深青獨青故氣芬芳恐古人所用以深青者爲勝不然諸蒿何嘗不青

本草衍義卷之十二

【連翹】亦不至翹出衆草。下濕地亦無。太山山谷間甚多。今止用其子。拚之。其間片片相比如翹。應以此得名爾。治心經客熱最勝。尤宜小兒。

【白頭翁】生河南洛陽界及新安土山中。性溫。止腹痛。暖腰膝。唐本注及藥性論甚詳。陶隱居失於不審。宜其排叱也。新安縣界兼山野中。屢嘗見之。正如唐本注所說。至今本處山中人賣白頭翁丸。言服之壽考。又失古人命名之意。

【菌茹】治疥馬疥尤善。服食方。用者至少。

【羊蹄】經不言根。圖經加根字。處處有葉。如菜中菠薐。但無歧。而色差青白。葉厚。花與子亦相似。葉可潔擦碗浦器。根取汁塗疥癬子。謂之金喬麥。燒煉家用以制鉛汞。又剉根、研、絞汁取三二匙。水半盞。煎一二沸。溫溫空肚服。治產後風秘殊驗。

【蒴藋】與陸英既性味及出產處不同。治療又別。自是二物。斷無疑焉。況蒴藋花白。子初青如棊豆顆。每朵如盞面大。又平生有一二百子。十月方熟紅。豈得言剩。出此條。孟浪之甚也。

【夏枯草】今又謂之鬱臭。自秋便生。經冬不瘁。春開白花。中夏結子。遂枯。古方丸燒灰合緊面藥。初生嫩時作菜食之。須浸洗淘去苦水。治瘰癧鼠滿。

【蚤休】無旁枝。止一莖。挺生高尺餘。頗有四五葉。葉有歧。似虎杖。中心又起莖。亦如是生葉。惟根入藥用。

【虎杖】根微苦。經不言味。此草藥也。蜀本圖經言作木。高丈餘。此全非虎杖。大率皆似寒菊。然花葉莖藥差大爲異。仍莖葉有淡黑斑。自六七月旋旋開花。至九月中方已。花片四出。其色如桃花。差大。外微深。陝西山麓水次甚多。今天下暑月多煎根汁爲飲。不得甘草。則不堪飲。藥性論云和甘草煎嘗之。甘美其味。卽是甘草之味。非虎杖也。論其攻治則甚當。

【馬勃】此唐韓退之所謂牛溲馬勃。俱收並蓄者也。有大如斗者。小亦如升杓。去膜。以蜜揉拌。少以水調。呷。治喉閉咽痛。

【虵莓】乍田野道傍。處處有之。附地生葉。如覆盆子。但光潔而小。微有縐紋。花黃。比蔌藜花差大。春末夏初結紅子。如荔枝色。餘如經。

【苧根】如蕁麻。花如白楊而長。成穗生。每一朵。凡數十穗。青白色。

【菰根】蒲類。四時取根擣。絞汁用。河朔邊人。止以此苗飼馬。曰菰將。及作薦。花如葦。結青子。細若青麻黃。長幾寸。彼人收之。合粟爲粥食之。甚濟饑。此杜甫所謂願作冷秋菰者是也。爲其皆生水中及岸際。多食亦令人利。

【蒩草】爾雅曰蒩。音猶。蔓子。左傳亦曰一薰一蒩。十年尙猶有臭者。是此草。

【蜜牛子】諸家之說紛紛不一。陶隱居尤甚。言花狀如藿豆。殊不相當。花朵如鼓子花。但碧色。日出開。日西合。今注又謂其中子類喬麥。亦非也。蓋直如木猴梨子。但黑色。可微炒。搗取其中粉一兩。別以麩炒去皮尖者。桃仁末半兩。以熟蜜和丸如梧桐子。溫水服三二十丸。治大腸風秘壅熱結澀。不可久服。亦行脾腎氣故也。

【苪麻子】作朵。生從下旋旋開花而上。從下結子。宛如牛身之蜱。取子炒熟。去皮爛嚼。臨睡服三二枚。漸加至十數枚。治瘰癧必效。

【葎草】葛勒蔓也。治傷寒汗後虛熱。剉、研、取生汁飲。一合、愈。

【獨行根】苗蔓生。子則馬篠零也。根扁。其嗅稍似葛根。細搗。水調傳丁腫。後有馬篠零條。

【芭蕉】三年已上。即有花自心中出。一莖止一花。全如蓮花。葉亦相似。但其色微黃綠。從下脫葉。花心但向上生。常如蓮樣。然未嘗見其花心。剖而視之。亦無蘂悉是葉。但花頭常下垂。每一朵自中夏開。直至中秋後方盡。凡三葉開。則三葉脫落。北地惜其種。人故少用。縷其苗爲布。取汁婦人塗髮令黑。餘說如經。

【蒲公草】今地丁也。四時常有花。花罷飛絮。絮中有子。落處即生。所以庭院間亦有者。蓋因風而來也。

【水紅子】不以多少。微炒一半。餘一半生用。同爲末。好酒調二錢。日三服。食後夜臥各一服。治瘰癧瘡破者亦治。水今大率與水紅相似。但枝低爾。今造酒取以水浸汁和麵作麴。亦假其辛味。

【角蒿】莖葉如青蒿。開淡紅紫花。花大約徑三四分。花罷結角子。長二寸許。微彎。苗與角治口齒絕勝。

【雀麥】今謂之鵝麥。其苗與麥同。但穗細長而疎。唐劉夢得所謂菟葵鵝麥。動搖春風者也。

【骨碎補】苗不似薑。薑苗如葦稍。此物苗每一大葉兩邊。小葉槎牙兩兩相對。葉長有尖瓣。餘如經。

【馬蒐零】蔓生。附木而上。葉脫時。零尚垂之。其狀如馬項鈴。故得名。然熟時則自拆。折間有子全者。採時須八九月間。治肺氣喘急。

【燈心草】陝西亦有。蒸熟乾。則拆取中心穰然燈者。是謂之熟草。又有不蒸。但生乾剝取者。爲生草。入藥宜用生草。

【威靈仙】治腸風。根性快。多服。疏人五臟眞氣。

【何首烏】兼黑髭鬢。與蘿蔔相惡。令人髭鬢早白。治腸風熱多用。

【五倍子】今染家亦用。口瘡以末摻之。便可飲食。

【金櫻子】經九月十月熟時採。不爾復令人利。

【萱草】根洗淨研汁一盞。生薑汁半盞。相和。時時細呷。治大熱衄血。

【葫蘆巴】本經云。得檳香子、桃仁。治膀胱氣。甚效。嘗合。惟桃仁麩炒各等分。半以酒糊丸。半爲散。每服五七十丸。空心食前鹽酒下。散以熱米飲調下。與丸子相間。空心服。日各一二服。

【金生草】丹石毒發於背。及一切癰腫。每以根葉一分。用酒一大盞。煎汁服。不惟下所服石藥。兼毒去瘡愈。如不欲酒。將末一二錢。新汲水調服。以知爲度。

【木賊】細剉。微微炒。搗爲末。沸湯點二錢。食前服。治小腸膀胱氣。緩緩服必效。

本草衍義卷之十三

【茯苓】乃樵斫訖多年。松根之氣所生。此蓋根之氣味。噎鬱未絕。故爲是物。然亦由土地所宜與不宜。其津氣盛者。方發泄於外。結爲伏苓。故不抱根而成物。既離其本體。則有苓之義。茯神者。其根但有津氣。而不甚盛。故止能伏結於本根。既不離其本。故曰茯神。此物行水之功多。益心脾。不可闕也。或曰松既樵矣。而根尚能生物乎。答曰。如馬勃菌五芝、木耳、石耳之類。皆生於枯木石糞土之上。精英未淪。安得不爲物也。其上有菟絲。下有茯苓之說。甚爲輕信。

【琥珀】今西戎亦有之。其色差淡而明徹。南方者色深而重濁。彼土人多碾爲物形。若謂千年茯苓所化。則其間有沾着蜾蠃蜂蟻。宛然完具者。是極不然也。地里誌云林邑多琥珀。實松脂所化耳。此說爲勝。但土地有所宜不宜。故有能化有不能化者。張茂先又爲燒蜂窠所作。不知得於何處。以手摩熱可以拾芥。餘如經。

【松黃】一如蒲黃。但其味差淡。治產後壯熱。頭痛頰赤。口乾唇焦。多煩燥渴。昏悶不爽。松花、川芎、當歸、石膏、蒲黃、五物等同爲末。每服二錢。水二合。紅花二稔。同煎七分。去滓。粥後溫溫細呷。【松子】多海東來。今關右亦有。但細小味薄。與栢子仁同治虛祕。

【栢】取澁以療馬瘧疥。今未見用松澁者。老人虛祕。栢子仁、大麻子仁、松子仁等分。同研。溶白蠟丸桐子

大以少黃丹湯服二三十丸食前嘗官陝西每登高望之雖千萬株皆一一西指蓋此木爲至堅之木不畏霜雪得木之正氣他木不逮也所以受金之正氣所制故一一向之

【桂】大熱素問云辛甘發散爲陽故漢張仲景桂枝湯治傷寒表虛皆須此藥是專用辛甘之意也本草第一又云療寒以熱藥故知三種之桂不取菌桂牡桂者蓋此二種性止溫而已不可以治風寒之病獨有一字桂本經言甘辛大熱此正合素問辛甘發散爲陽之說尤知菌牡二桂不及也然本經止言桂仲景又言桂枝者蓋亦取其枝上皮其木身麤厚處亦不中用諸家之說但各執己見終無證據今又謂之官桂不知緣何而立名慮後世爲別物故書之又有桂心此則諸桂之心不若一字桂也

【楓香】與松脂皆可亂乳香尤宜區別楓香微黃白色燒之尤見眞僞兼能治風癩瘡痒毒水煎熱燥洗

【乾漆】若濕漆藥中未見用凡用者皆乾漆耳其濕者在燥熱及霜冷時則難乾得陰濕雖寒月亦易乾亦物之性也若霑漬人以油治之凡驗漆惟稀者以物釀起細而不斷斷而急收起又塗於乾竹上蔭之速乾者並佳餘如經

【蔓荊實】諸家所解蔓荊牡荊紛糺不一經既言蔓荊明知是蔓生即非高木也既言牡荊則自是木上生者況漢書郊祀志所言以牡荊莖爲幡竿故知蔓荊即子大者是又何疑焉後條有蘗荊此即便是牡荊也子青色如茱萸不合更立蘗荊條故文中云本草不載亦無別名但有蘗花功用又別斷無疑焉注中妄稱石荊當之其說轉見穿鑿

【桑寄生】新舊書云。今處處有之。從宦南北。實處處難得。豈歲歲窠斫摘踐之苦而不能生邪。抑方宜不同也。若以爲鳥食物子落枝節間感氣而生。則麥當生麥。穀當生穀。不當但生此一物也。又有於柔滑細枝上生者。如何得子落枝節間。由是言之。自是感造化之氣別是一物。古人當日惟取桑上者。寔假其氣耳。又云今醫家鮮用。此極誤矣。今醫家非不用也。第以難得眞桑上者。嘗得眞桑寄生。下嚥必驗如神。向承乏吳山。有求藥於諸邑者。乃遍令人搜摘。卒不可得。遂以實告。甚不樂。蓋不敢以僞藥罔人。鄰邑有人僞以他木寄生送之。服之逾月而死。哀哉。

【沉香木】嶺南諸郡悉有之。旁海諸州尤多。交榦連枝。崗嶺相接。千里不絕。葉如冬青。大者合數人抱。木性虛柔。山民或以構茅廬。或爲橋梁。或爲飯甑。尤佳有香者百無一二。蓋木得水方結。多在折枝枯榦中。或爲沉。或爲煎。或爲黃熟。自枯死者。謂之水盤香。今南恩高竇等州。惟產生結香。蓋山民入山見香木之曲榦斜枝。必以刀斫成坎。經年得雨水所漬。遂結香。復以鋸取之。刮去白木。其香結爲斑點。遂名鷓鴣斑。燔之極清烈。沉之良者。惟在瓊崖等州。俗謂之角沉。黃沉乃枯木中得者。宜入藥用。依木皮而結者。謂之青桂。氣尤清。在土中歲久。不待刓剔而成者。謂之龍鱗。亦有削之自卷。咀之柔韌者。謂之黃蠟沉。尤難得也。然經中止言療風水毒腫。去惡氣。餘更無治療。今醫家用以保和衞氣。爲上品藥。須極細爲佳。今人故多與烏藥磨服。走散滯氣。獨行則勢弱。與他藥相佐。當緩取效。有益無損。餘藥不可方也。【薰陸香】木葉類棠梨。南印度界阿吒簷國出。今謂之西香。南番者更佳。此卽今人謂之乳香。爲其垂滴如乳。鎔塌在地

者謂之場香皆一也

【丁香】日華子云治口氣此正是御史所含之香治胃寒及脾胃冷氣不和有大者名母丁香氣味尤佳爲末縫紗囊如小指實末內陰中主陰冷病中病便已

【蘗木】今用皮以蜜炙與青黛各一分同爲末入生龍腦一字研勻治心脾熱舌頰生瘡當摻瘡上有涎卽吐又張仲京蘗皮湯無不驗傷寒論中已著

【辛夷】先花後葉卽木筆花也最先春以其花未開時其花苞有毛光長如筆故取像曰木筆有紅紫二本一本如桃花色者一本紫者今入藥當用紫色者仍須未開時收取入藥去毛苞

【榆皮】今初春先生夾者是去上皺澀乾枯者將中間嫩處剉乾磑爲粉當歉歲農將以代食葉青嫩時收貯亦用以爲羹茹嘉祐年過豐沛人闕食鄉民多食此

【蕪荑】有大小兩種小蕪荑卽榆莢也採取仁醞爲醬味尤辛入藥當用大蕪荑別有種然小蕪荑醞造多假以外物相和切須擇去也治大腸寒滑及多冷氣不可闕

【酸棗】微熱經不言用仁仍療不得眠天下皆有之但以土產宜與不宜嵩陽子曰酸棗縣卽滑之屬邑其木高數丈味酸醫之所重今市人賣者皆棘子此說未盡殊不知小則爲棘大則爲酸棗平地則易長居崖塹則難生故棘多生崖塹上久不樵則成榦人方呼爲酸棗更不言棘徒以世人之意如此在物則曷若是也其實一本以其不甚爲世所須及礙塞行路故成大木者少多爲人樵去然此物纔及三尺便

開花結子。但窠小者氣味薄。本大者氣味厚。又有此別。今陝西臨潼山野所出者亦好。亦土地所宜也。並可取仁。後有白棘條。乃是酸棗未爲大時。枝上刺也。及至長成。其刺亦少。實亦大。故棗取大木。刺取小窠也。亦不必強分別爾。

【槐實】止言實。今當分爲二。實本出夾中。若擣夾作煎者。當言夾也。夾中子。大如豆。堅而紫色者。實也。今本條不析出夾與夾中子。蓋其用各別。皆疎導風熱。

【槐花】今染家亦用。收時折其未開花。煮一沸。出之釜中。有所澄下。稠黃滓。滲漉爲餅。染色更鮮明。治腸風熱瀉血甚佳。不可過劑。

【枸杞】當用梗皮。地骨當用根皮。枸杞子當用其紅實。是一物有三用。其皮寒。根大寒。子微寒。亦三等。此正是孟子所謂性由杞柳之杞。後人徒勞分別。又爲之枸棘。茲強生名耳。凡杞未有無棘者。雖大至有成架。然亦有棘。但此物小則多刺。大則少刺。還如酸棗及棘。其實皆一也。今人多用其子。直爲補腎藥。是曾未考究。經意當更量其虛實冷熱用之。

本草衍義卷之十四

【龍眼】經曰一名益智。今專爲果。未見入藥。補注不言神農本草編入木部中品。果部中復不曾收入。今除爲果之外。別無龍眼。若謂爲益智子。則專調諸氣。今爲果者復不能也。剜自有益智條。遠不相當。故知木部龍眼。卽便是今爲果者。按今注云甘味歸脾而能益智。此說甚當。

【厚朴】今西京伊陽縣及商州亦有。但薄而色淡。不如梓州者厚而紫色有油。味苦。不以薑製。則棘人喉舌平胃散中用。最調中。至今此藥盛行。既能溫脾胃氣。又能走冷氣。爲世所須也。

【猪苓】行水之功多。久服必損腎氣。昏人目。果欲久服者更宜詳審。

【竹葉】凡諸竹與笋。性皆微寒。故知葉其用一致。本經不錄苦笋及苦竹性。若取瀝作油。亦不必強擇也。張仲景竹葉湯。會淡竹笋。難化不益脾。鄰家一小兒方二歲。偶失照管。壯熱喘麁不食。多睡。仰頭呻吟。微嘔噦瞑目多驚。凡三五日。醫作慢驚治之。治不對病。不愈。忽然其母誤將竹巴豆食藥作驚藥。化五丸如麻子大。灌之。大久大吐。有物噎於喉中。乳媪以指摘出之。約長三寸。麁如小指。乃三日前臨堦曝者乾箭笋。是夜諸證皆定。次日但以和氣藥調治遂安。其難化也如此。經曰問而知之者謂之工。小兒不能問。故爲難治。醫者當愼謹也。

【枳實】枳殼一物也。小則其性酷而速。大則其性詳而緩。故張仲景治傷寒倉卒之病。承氣湯中用枳實。

此其意也。皆取其疎通、決泄、破結實之義。他方但導敗風壅之氣。可常服者。故用枳殼。其意如此。

【山茱萸】與吳茱萸甚不相類。山茱萸色紅。大如枸杞子。

【吳茱萸】如川椒。初結子時。其大小亦不過椒。色正青。得名則一。治療又不同。未審當日何緣如此命名。然山茱萸補養腎臟。無一不宜。經與注所說備矣。

【吳茱萸】須深湯中浸去苦烈汁。凡六七過。始可用。今文與注及注中藥法皆不言。亦漏落也。此物下氣最速。腸虛人服之愈甚。

【梔子】仲景治發汗吐下後。虛煩不得眠。若劇者。必反覆顛倒。心中懊憹。梔子豉湯治之。虛故不用大黃。有寒毒故也。梔子雖寒無毒。治胃中熱氣。既亡血亡津液。腑藏無潤養。內生虛熱。非此物不可去。張仲景傷寒論已著。又治心經留熱。小便赤澀。去皮。山梔子、火炮大黃、連翹、甘草炙、等分、末之。水煎三二錢匕。服之無不效。

【檳榔】書所說甚詳。今人又取尖長者入藥。言其快銳速效。屢嘗試之。果如其說。

【合歡花】其色如今之醮暈線。上半白。下半肉紅。散垂如絲。爲花之異。其綠葉至夜則合。又謂之夜合花。陳藏器日華子皆曰皮殺蟲。又曰續筋骨。經中不言。

【秦椒】此秦地所實者。故言秦椒。大率椒株皆相似。秦椒但葉差大。椒粒亦大。而紋低。不若蜀椒皺紋高爲異也。然秦地亦有蜀種。椒。如此區別。

【衞矛】所在山谷皆有之。然未嘗於平陸地見也。葉絕少。其莖黃褐色。若蘗皮。三面如鋒刃。人家多燔之。遺崇。方家用之亦少。

【紫葳】今蔓延而生。謂之爲草。又有木身。謂之爲木。又須物而上。然榦不逐冬斃。亦得木之多也。故分入木部爲至當。唐白樂天詩有木名凌霄。擢秀非孤標。由是益知非草也。本經又云莖葉味苦。是與瞿麥別一種甚明。唐本注云。且紫葳瞿麥皆本經所載。若用瞿麥根爲紫葳。何得復用莖葉。此說盡矣。然其花赭黃色。本條雖不言其花。又却言莖葉味苦。則紫葳爲花。故可知矣。

【蕪荑】性溫。治大腸寒滑。不可闕也。須佐以他藥爲丸服。溫而散走寒氣。

【茗苦楛】今茶也。其文有陸羽茶經。丁謂北苑茶錄。毛文錫茶譜。蔡宗顏茶山節對。其說甚詳。然古人謂其芽爲雀舌麥顆。言其至嫩也。又有新芽一發便長寸餘。微麁。如針。惟牙長爲上品。其根榦水土力皆有餘。故也。如雀舌麥顆又下品。前人未盡識。誤爲品題。唐人有言曰。釋滯消壅。一日之利。晳佳斯言甚當。飲茶者宜原其始終。又晉溫嶠上表貢茶千斤。茗三百斤。郭璞曰。早採爲茶。晚採爲茗。茗或曰荈。尺兗切。葉老者也。

【桑根白皮】條中桑之用稍多。然獨遺烏椹。桑之精英盡在於此。採摘。微研。以布慮去滓。石器中熬成稀膏。量多少入蜜。再熬成稠膏。貯甆器中。每抄一二錢。食後夜臥。以沸湯點服。治服金石發熱渴生精神。及小腸熱。性微涼。

【白棘】一名鍼。一名棘刺。按經如此甚明。諸家之意強生疑惑。今掠不取。求其經而可矣。其白棘。乃是取其肥盛紫色。枝上有皺薄白膜先剝起者。故曰白棘。取白之意。不過如此。其棘刺花。乃是棘上所開花也。餘無他義。今人燒枝取油。塗垢髮。使垢解。

【龍腦】條中與圖經所說各未盡。此物大通利關鬲熱塞。其清香爲百藥之先。大人小兒風涎閉壅。及暴得驚熱。甚濟用。然非常服之藥。獨行則勢弱。佐使則有功。於茶亦相宜。多則掩茶氣味。萬物中香無出其右者。西方抹羅短吒國在南印度境。有羯布羅香。榦如松株。葉異。濕時無香。採乾之後折之。中有香。狀類雲母。色如冰雪。此龍腦香也。蓋西方亦有。

【菴摩勒】餘甘子也。解金石毒。爲末作湯點服。佛經中所謂菴摩勒果者。是。此蓋西度亦有之。

【紫鈲】音鑞。如糖霜。結於細枝上。累累然。紫黑色。研破則紅。今人用造綿烟脂。邇來亦難得。餘如經。

【天竹黃】自是竹內所生。如黃土着竹成片。涼心經。去風熱。作小兒藥尤宜。和緩故也。

【天竺桂】與牡菌桂同。味薄而已。

【烏藥】和來氣少走泄多。但不甚鋼猛。與沉香同磨作湯。點治胸膈冷氣。甚穩當。

【沒藥】大概通滯血。打撲損疼痛。皆以酒化服。血滯則氣壅淤。氣壅淤則經絡滿急。經絡滿急。故痛且腫。凡打撲着肌肉須腫脹者。經絡傷。氣血不行。壅淤。故如是。

【墨】松之煙也。世有以粟草灰僞爲者。不可用。須松煙墨方可入藥。然惟遠煙爲佳。今高麗國每貢墨於中國。不知用何物合和。不宜入藥。此蓋未達不敢嘗之義。又治大吐血。好墨細末二錢。以白湯化阿膠清調。稀稠得所。頓服。熱多者尤相宜。又鄜延界內有石油燃之。煙甚濃。其煤可爲墨。黑光如漆。松煙不及。其識文曰延川石液者。是不可入藥。當附于此。

本草衍義卷之十五

【石南葉】狀如枇杷葉之小者。但背無毛。光而不皺。正二月間開花。冬有二葉爲花苞。苞既開。中有十五餘花。大小如椿花甚細碎。每一苞約彈許大。成一毬。一花六葉。一朵有七八毬。淡白綠色。葉末微淡赤色。花既開。藥滿花。但見藥不見花。花纔罷。去年綠葉盡脫落。漸生新葉。治腎衰、脚弱。最相宜。但京洛河北河東山東頗少。人以此故少用。湖南北江東西二浙甚多。故多用。南實今醫家絕可用。

【蜀椒】須微炒使汗出。又須去附紅黃殼。去殼之法。先微炒。乘熱入竹筒中。以梗椿之。播取紅。如未盡更揀。更椿。以盡爲度。凡用椒須如此。其中子謂之椒目。治盜汗尤功。將目微炒。搗爲極細末。用半錢匕。以生猪上脣煎湯一合調。臨睡服。無不効。蓋椒目能行水。又治水蠱。

【莽草】今人呼爲菌草。濃煎湯。淋漬皮膚麻痺。本經一名春草。諸家皆謂爲草。今居木部。圖經亦然。今世所用者皆木葉也。如石楠枝梗、乾則縐。揉之。其嗅如椒。爾雅釋草云。葞、春草。釋曰。今莽草也。與本經合。今當具言之。石南條中陶隱居注云。似菌草。凌冬不凋。誠木無疑。

【郁李仁】其子如御李子、至紅熟。堪啗。微澀。其仁、湯去皮。研極爛。入生龍腦。點赤目。陝西甚多。根煎湯。漬鳳蚰牙。

【鼠李】卽牛李子也。木高七八尺。葉如李。但狹而不澤。子於條上四邊生。熟則紫黑色。生則青。葉至秋則

落子尙在枝是處皆有故經不言所出處今關陝及湖南江南北甚多木皮與子兩用

【欒華】今長安山中亦有其子卽謂之木欒子攜至京都爲數珠未見其入藥

【杉】其幹端直大抵如松多不凋但葉闊成枝廬山有萬杉寺卽此杉也作屑煮汁浸洗脚氣腫滿今處處有

【楠材】今江南等路造船場皆此木也緣木性堅而善居水久則多中空爲白蟻所穴

【榧實】大如橄欖殼色紫褐而脆其中子有一重麩黑衣其仁黃白色嚼久漸甘美五痔人常如果食之愈過多則滑腸

【櫟木皮】今人呼爲櫟柳然葉謂柳非柳謂槐非槐木最大者高五六十尺合二三人抱湖南北甚多然亦下材也不堪爲器用嫩皮取以緣栲栳與箕脣

【白楊】陝西甚多永耀間居人脩蓋多此木也然易生根斫木時碎札入土卽下根故易以繁植非止墟墓間於人家舍前後及夾道往往植之土地所宜爾風纔至葉如大雨聲葉梗故如是又謂無風自動則無此事嘗官永耀間熟見之但風微時當風逕者其葉孤絕處則往往獨搖以其蒂細長葉重大微風雖過故往來卒無已時勢使然也其葉面青光背白木身微白故曰白楊非如粉之白

【欒荊】卽前所謂牡荊也不合更立此條況本經元無欒荊已具蔓荊實條中

【紫荊木】春開紫花甚細碎共作朵生出無常處或生於木身之上或附根土之下直出花花罷葉出光

緊。微圓。園圃間多植之。

【鈎籐】中空二經不言之。長八九尺。或一二丈者。湖南北江南江西山中皆有。小人有以穴隙間致酒甕中。盜取酒以氣吸之。酒既出。涓涓不斷。專治小兒驚熱。

【橄籐子】紫黑色。微光。大一二寸。圓褊。治五痔有功。燒成黑灰。微存性。米飲調服。人多剔去肉。作藥瓢垂腰間。

【皂莢】其子炒春去赤皮、仁、將骨浸軟。煮熟。以糖漬之。可食。甚疎導五臟風熱壅。其莢。不蚛肥者。微炙爲末。一兩。入生白礬末半兩。腻粉半兩。風涎潮塞。氣不通。水調嚥一二錢。但過咽。則須吐涎。凡用白礬者。分隔下涎也。又暑中濕熱時。或久雨。合蒼朮燒辟溫疫邪濕氣。

【柳華】經曰味苦。卽是初生有黃蘂者也。及其華乾絮方出。又謂之柳絮。收之。貼炙瘡。及爲茵褥。絮之下連小黑子。因風而起。得水濕處便生。如地丁之類。多不因種植。於人家庭院中自然生出。蓋亦如柳絮兼子而飛。陳藏器之說是。然古人以絮爲花。陶隱居亦曰。花隨風。狀如飛雪。誤矣。經中有實及子汁。諸家不解。今人亦不見用。釋氏謂柳爲尼俱律陀木。其子極細。如人妾因極小妾果至大。是知小黑子得因風而起。

【桐葉】經注不指定是何桐。致難執用。今具四種桐。各有治療條。其狀列于後。一種白桐。可斲琴者。葉三枝。開白花。亦不結子。藥性論云。皮能治五淋。沐髮。去頭風生髮。一種荏桐。早春先開。淡紅花。狀如鼓子花

成筒子。子或作桐油。日華子云。桐油冷。微毒。一種梧桐。四月開。淡黃小花。一如槐花。枝頭出絲。墮地成油。霑漬衣履。五六月結桐子。今人收炒作果。動風氣。此是月令清明之日桐始華者。一種崗桐。無花。不中作琴。體重。

【烏臼】葉如小杏葉。但微薄而綠色差淡。子八九月熟。初青後黑。分爲三瓣。取子出油，然燈及染髮。

【阿黎勒】氣虛人亦宜。緩緩煨熟。少服。此物雖澀腸而又泄氣。蓋其味苦澀。

【椿木華】【樗】皆臭。但一種有花結子。一種無花不實。世以無花不實。木身大。其幹端直者爲椿。椿用木葉。其有花而莢。木身小。幹多迂矮者爲樗。樗用根葉莢。故曰未見椿上有莢者。惟樗木上有。又有樗雞。故知古人命名曰不言椿雞。而言樗雞者。以顯有雞者爲樗。無雞者爲椿。其義甚明。用椿木葉。樗木根葉夾者。宜依此推窮。洛陽一女子。年四十六七。耽飲無度。多食魚蟹。攝理之方蔑如也。後以飲啖過常。蓄毒在臟。日夜二三十瀉。大便與膿血雜下。大腸連肛門痛不堪任。醫以止痢藥不效。又以腸風藥則益甚。蓋腸風則有血而無膿。凡如此已半年餘。氣血漸弱。食漸減。肌肉漸瘦。稍服熱藥。則腹愈痛。血愈下。服稍涼藥。即泄注氣羸。粥愈減。服溫平藥則病不知。如此將朞歲。醫告術窮。垂命待盡。或有人教服人參散。病家亦不敢主。嘗謾與服之。纔一服知。二服減。二服膿血皆定。自此不十服。其疾遂愈。後問其方。云治大腸風虛。飲酒過度。挾熱下痢。膿血疼痛。多日不差。樗根白皮一兩。人參一兩。爲末。每用二錢匕。空心。以溫水調服。如不飲酒。以溫米飲代。忌油膩濕麪。青菜菓子。甜物。雞猪魚腥等。

【胡椒】去胃中寒痰吐水食已卽吐甚驗過劑則走氣大腸寒滑亦用須各以他藥佐之

【橡實】櫟木子也葉如栗葉在處有但堅而不堪充材亦木之性也山中以椿仁爲糧然澁腸木善爲炭他木皆不及其殼堪染皂若曾經雨水者其色淡不若不經雨水者櫟亦有殼但少而不及櫟木所實者

【無石子】今人合他藥染髭

【槲若】亦有斗但不及櫟木雖堅而不堪充材葉微炙炒槐花減槲葉之半同爲末米飲調服治初得腸風及血痔熱多者尤佳亦堪爲炭但不及櫟木

【黃藥】亦治馬心肺熱有功

【無患子】今釋子取以爲念珠出佛經惟取紫紅色小者佳今入藥絕少西洛亦有之

【椰子】開之有汁如乳極甘香自別是一種氣味中又有一塊瓤形如瓜蓏上有細壠起亦白色但微虛紋若婦人裙褶其味亦如其汁又着殼一重白肉剔取之皆可與瓤糖煎爲果汁色如白酒其味如瓤然謂之酒者好事者當日強名之取其殼爲酒器如酒中有毒則酒沸起今人皆漆其裏則全失用椰子之意

【樺木皮】燒爲黑灰合他藥治肺風毒及取皮上有紫黑花勻者裹鞍弓鐙

【赤楝木】又謂之三春柳以其一年三秀也花肉紅色成細穗河西者戎人取滑枝爲鞭京師亦甚多

【木籠子】蔓生歲一枯葉如蒲桃實如大栝樓熟則紅黃色微有刺不能刺人今荆南之南皆有之九月

十月熟實中之子曰木蘧子但根不死春旋生苗其子一頭尖者爲雄凡植時須雌雄相合麻縷纏定及其生也則去其雄者方結實

【木槿】小如葵花淡紅色五葉成一花朝開暮斂花與枝兩用湖南北人家多種植爲籬障餘如經

【櫻櫚木】今人旋爲器皮燒爲黑灰治婦人血露及吐血仍佐之他藥每歲剛取椶皮不爾束死花如魚子淖熟淹爲果

【柘木】裏有紋亦可旋爲器葉飼蠶曰柘蠶葉梗然不及桑葉束行根及皮煮汁釀酒治風虛耳聾有驗餘如經

本草衍義卷之十六

【髮髮】與亂髮自是兩等。髮髮味苦。卽陳舊經年歲者。如橘皮皆橘也。而取其陳者。狠毒麻黃吳茱萸半夏枳實之類。皆須陳者。謂之六陳。入藥更良。敗蒲亦然。此用髮之義耳。今人又謂之頭髮。其亂髮條中。自無用髮之義。此二義甚明。亦不必如此過謂搜索。右以亂髮如雞子大。無油器中熬燋黑。就研爲末。以好酒一盞沃之。何首烏末二錢。同勻攪。候溫嚥之。下咽過一二刻。再嚥。治破傷風。及沐髮中風。極效。

【人乳汁】治目之功多。何也。人心生血。肝藏血。肝受血則能視。蓋水入於經。則其血乃成。又曰上則爲乳汁。下則爲月水。故知乳汁則血也。用以點眼。豈有不相宜者。血爲陰。故其性冷。藏寒人如乳餅酪之類不可多食。雖曰牛羊乳。然亦不出乎陰陽造化爾。西戎更以駝馬乳爲酥酪。老人患口瘡不能食。飲人熱乳良。

【人屎】用乾陳者爲末。於陰地淨黃土中。作五六寸小坑。將末三兩匙於坑中。以新汲水調勻。良久俟澄清。與時行大熱狂渴須水人飲之。愈。今世俗謂之地漬。然飲之勿極意。恐過多耳。又治一切癰癤熱毒瘴膿血未潰。疼痛不任。用乾末麝香各半錢。同研細。抄一豆大。津唾則瘡心。醋麵錢子貼定。膿潰出去藥。

【人溺】須童男者。產後溫一盃飲。嚥下敗血惡物。有飲過七日者。過多恐久遠血藏寒。今人發帶病人亦不覺。氣血虛無熱者。尤不宜多服。此亦性寒。故治熱勞方中亦用。

【人指甲】治鼻衄細細刮取。俟血稍定。去淤血。於所衄鼻中搐之。立愈。獨不可備。則衆人取之。甚善。衄藥并法最多。或效或不效。故須博採。以備道途田野中用。

【龍骨】諸家之說紛然不一。既不能指定。終是臆度。西京頴陽縣民家。忽崖壞。得龍骨一副。支體頭角悉具。不知其蛻也。其斃也。若謂蛻斃。則是有形之物。而又生不可得見。死方可見。謂其化也。則其形獨不能化。然西域記中所說甚詳。但未敢據憑。萬物所稟各異。造化不可盡知。莫可得而詳矣。孔子曰君子有所不知。蓋闕如也。妄亂穿鑿。恐誤後學。治精滑及大腸滑。不可闕也。

【牛黃】亦有駱駝黃。皆西戎所出也。駱駝黃極易得。醫家當審別考而用之。爲其形相亂也。黃牛黃輕鬆自然微香。以此爲異。蓋又有氂（音貓）牛黃。堅而不香。

【麝】每麝時。須聚於一所。人見其所聚麝。及有遺麝氣。遂爲人獲。亦物之一病爾。此獵人云。餘如經。

【象牙】取口兩邊各出一牙下垂夾鼻者。非口內食齒。齒別入藥。今爲象笏者是牙也。

【猩猩】作酪時。上一重凝者爲酪面。酪面上。其色如油者爲醍醐。熬之即出。不可多得。極甘美。雖如此取之。用處亦少。惟潤養瘡痂最相宜。

【犀角】凡入藥須烏色。未經湯水浸煮者。故曰生犀。川犀及南犀。紋皆細。烏犀尙有顯紋者。露黃犀紋絕少。皆不及西番所出。紋高雨脚顯也。物像黃外黑者爲正。透物像黑外黃者爲倒透。蓋以烏爲正。以形像

肖物者爲佳。既曰通犀。又須紋頭顯。黃黑分明。透不脫。有雨脚滑潤者爲第一。鹿取茸。犀取尖。其精銳之力盡在是矣。犀角尖磨服爲佳。若在湯散。則屑之。西番者佳。

【羚羊角】今皆取有掛痕者。陳藏器取耳邊聽之集集鳴者良。亦強出此說。未嘗遍試也。今將他角附耳。皆集集有聲。不如有掛痕一說盡矣。然多僞爲之。不可不察也。

【羧羊角】出陝西河東。謂之羖攩羊。尤很健。毛最長而厚。此羊可入藥。如要食不如無角。白大羊。本草不言者亦有所遺爾。又同華之間。有臥沙細肋。其羊有角似羧羊。但低小供饌。在諸羊之上。張仲景治寒疝。用生薑羊肉湯。服之無不驗。又一婦人產當寒月。寒氣入產門。臍下脹滿。手不敢犯。此寒疝也。醫將治之。以抵當湯。謂其有瘀血。嘗教之曰。非其治也。可服張仲景羊肉湯。少減水二服遂愈。

【牛角鰓】此則黃牛角腮。用尖燒爲黑灰。微存性。治婦人血崩。大便血。及冷痢。又白水牛鼻乾濕皆可用。治偏風口喎斜。以火炙熱。於不患處一邊熨之。漸正。

【犬膵】塗鋑如金色。又救生。接元氣。補虛損。燻黃狗脊骨一條。去兩頭。截爲五七段。帶肉些。小用好砌砂一兩。細研。藥水二升。入砌砂在藥水中攪勻。浸骨三日後。以灰火炙令黃色。又入汁藥。候汁盡爲度。其狗骨已酥。騈搗令極細。後入諸藥。

肉蓯蓉 去沙薄切。酒浸二日曝乾。 菟絲子 酒浸二日曝乾。 杜仲 去麁皮。 肉桂 去皮上。 附子 炮去皮臍。 鹿茸 急燎去毛。酥炙黃色。不可令乾。 薑炮 已上各一兩。 蛇床子 半兩。微炒。 陽起石 半兩。酒煮一日。令數人不住手研一日。

將前八味同杵羅爲末。次入陽起石。幷狗骨末。用熟

棗肉五兩。酥一兩。同和。再搗千餘下。看硬軟。丸如小豆大。曝乾。每日空心鹽湯下二十丸。

【鹿茸】他獸肉多屬十二辰。及八卦。昔黃帝立子丑等爲十二辰。以名月。又以名獸。配十二辰屬。故麋鹿肉爲肉中第一者。避十二辰也。味亦勝他肉。三祀皆以鹿腊。其義如此。茸最難得。不破及不出却血者。蓋其力盡在血中。獵時多有損傷故也。茸上毛先薄。以酥塗勻。於烈燄中急炙之。若不先以酥塗。恐火燄傷茸。俟毛淨。微炙入藥。今人亦能將麻茸僞爲之。不可不察也。頭亦可釀酒。然須作漿時。稍益葱椒。角爲膠。別有法。按月令。冬至一陽生。麋角解。夏至一陰生。鹿角解。各逐陰陽分合。如此解落。今人用麋鹿茸作一種。殆疎矣。凡麋鹿角自生至堅完。無兩月之久。大者二十餘斤。其堅如石。計一晝夜須生數兩。凡骨之類。成長無速於此。雖草木至易生。亦無能及之。豈可與凡骨血爲比。麋茸利補陽。鹿茸利補陰。凡用茸無須太嫩。唯長四五寸。茸端如馬磉紅者最佳。須佐以他藥。則有功。

【虎骨】頭脛與脊骨入藥。肉微鹹。陳藏器所注。乙骨之事。反射之目光墮地。如白石之說。必得之於人。終不免其所誣也。人或問曰。風從虎何也。風木也。虎金也。木受金制。焉得不從。故呼嘯則風生。自然之道也。所以治風攣急。屈伸不得。走痓癲疾。驚癇。骨節風毒等。乃此義耳。

【豹肉】毛赤黃。其紋黑如錢而中空。比比相次。此獸猛捷。過虎。故能安五藏。補絕陽。輕身。又有土豹。毛更無紋。色亦不赤。其形亦小。此各自有種。非能變爲虎也。聖人假喻而已。恐醫家未喻。故書之。

【狸骨】形類貓。其紋有二。一如連錢者。一如虎紋者。此二色狸。皆可入藥。其肉味與狐不相遠。江西一種

牛尾狸。其尾如牛。人多糟食。未聞入藥。孟詵云骨理痔病。作羹臛食之。然則骨如何作羹臛。（音郝。肉羹也。）炙骨和麝香雄黃爲丸。服治痔及瘻瘡甚效。

【兎】有白毛者。全得金之氣也。入藥尤功。餘兎至秋深時則可食。金氣全也。纔至春夏。其味變。取四脚肘後毛爲逐食。飼鵰鷹。至次日。却吐出。其意欲腹中逐盡脂肥。使饑急捕逐速爾。然作醬必使五味。既患豌豆瘡。又食此。則發毒太甚。恐班爛損人。

【鼷鼠】經中不言性味。惟是於難產通用。藥中云鼷（音贏）鼠微溫。毛赤黑色。長尾。人捕得。取皮爲煖帽。但向下飛則可。亦不能致遠。今關西山中甚有。毛極密。人謂之飛生者是也。注中又引水馬。首如馬。身如蝦。背偏僂。身有竹節紋。長二三寸。今謂之海馬。

【鼷鼠】鼷鼠也。其毛色如小。今京畿田中甚多。脚絕短。但能行。尾長寸許。目極小。項尤短。兼易掘取。或安竹弓射之。用以飼鷹。陶不合更引。今諸山林中大如水牛。形似猪。灰亦色者也。設使是鼠。則孰能見其溺精成鼠也。陶如此輕信。但眞醇之士。不以無稽之言爲妄矣。今經云在土中行。則鼷鼠無疑。

【獺】四足俱短。頭與身尾皆褊。毛色若故紫帛。大者身與尾長三尺餘。食魚。居水中。出水亦不死。亦能休於大木上。世謂之水獺。嘗磨置大水甕中。於其間旋轉如風。水謂之成旋。壠起。四面高。中心凹下。觀者駭目。皮西戎將以飾毳服領袖。問之云。垢不着。如風霾翳目。卽就袖口飾目中。卽出。又毛端果不着塵。亦一

異也。又本草敍例言獺膽分盃嘗試之不驗。惟塗於盞唇。但使酒稍高于盞面。分盃之事。亦古今傳誤言也。不可不正之。肝、用之有驗。

【狐】今用肝治風。皮兼毛用爲裘者。是也。此獸多疑。極審聽。人智出之。以多疑審聽而捕取。捕者多用罝。

【猸】肥矮。毛微灰色。頭連脊毛一道黑。背尖黑。尾短闊。蒸食之極美。貉形如小狐。毛黃褐色。野獸中猸肉最甘美。仍益瘦人。

【野猪】黃在膽中。治小兒諸癎疾。京西界野猪甚多。形如家猪。但腹小脚長。毛色褐。作羣、行。獵人惟敢射最後者。射中前奔者。則羣猪散走傷人。肉色赤如馬肉。其味甘。肉復軟。微動風。黃不常有。間得之。世亦少用。食之尚勝家猪。

【驢肉】食之動風。脂肥尤甚。屢試屢驗。日華子以謂止風狂。治一切風。未可憑也。煎膠用皮者。取其發散皮膚之外也。仍須烏者。用烏之意。如用烏雞子、烏蛇、烏鴉之類。其物雖治風。然更取其水色。蓋以治其熱則生風之義。

【腽肭臍】今出登萊州。藥性論以謂是海內狗外腎。日華子又謂之獸。今觀其狀。非狗非獸。亦非魚也。但前卽似獸。尾卽魚。其身有短密淡青白毛。腹脇下全白。仍相間於淡青白毛上有深青黑點。久則色復淡。皮厚且韌。如牛皮。邊將多取以飾鞍韉。其臍治臍腹積冷。精衰。脾腎勞極。有功。不待別試也。似狐長尾之說。蓋今人多不識。麅獐之屬。又小於獐。但口兩邊有長牙。好鬬。則用其牙。皮爲第一。無出其右者。然多牙

傷痕四方皆有山深處則頗多其聲如擊破鉞

【野駝】生西北界等處家生者峯蹄最精人多煑熟糟啖糞爲乾末搐鼻中治鼻衂此西番多用嘗進築於彼屢見之

【敗鼓皮】黃牛皮爲勝今不言是何皮蓋亦以驢馬皮爲之者唐韓退之所謂牛溲馬勃敗鼓之皮俱收並蓄待用無遺者今用處爾少尤好煎膠專用牛皮始可入藥

【丹雄雞】今言赤雞者是也蓋以毛色言之巽爲雞爲風雞鳴於五更者日將至巽位感動其氣而鳴也體有風人故不可食經所著其用甚備產後血暈身痙直帶眼口角與目外眥向上牽急不知人取子一枚去殼分清以荆芥末二錢調服遂安仍依次調治若無他疾則不須功甚敏捷烏雞子尤喜經注皆不言雞發風今體有風人食之無不發作爲雞爲巽信可驗矣食雞者當謹

【鶩肪】陶隱居云鶩音牧卽是鴨然有家鴨有野鴨陳藏器本草曰尸子云野鴨爲鳧家鴨爲鶩蜀本注云爾雅云野鳧鶩注云鴨也如此則鳧鶩皆是鴨也又云本經用鶩肺卽家鴨也如此所說各不同其義不定又按唐王勃滕王閣記云落霞與孤鶩齊飛則明知鶩爲野鴨也勃唐之名儒必有所據故知鶩爲野鴨明矣

【鴈肪】人多不食者謂其知陰陽之升降分長少之行序世或謂之天厭亦道家之一說爾食之則治諸

風。唐本注曰。鴈爲陽鳥。其義未盡。茲蓋得中和之氣。熱則卽北。寒則卽南。以就和氣。所以爲禮幣者。一以取其信。二取其和。

【鷓鴣】鄭谷所謂相呼相應湘天闊者。南方專充庖。然治瘴及菌毒甚效。餘悉如經。

【雉】其飛若矢。一往而墮。故今人取其尾置船車上。意欲如此快速也。漢呂太后名雉。高祖字之曰野雞。其實卽雞屬也。食之所損多。所益少。

【鷹屎白】兼他藥用之。作潰虛積藥。治小兒妳癖黃。鷹糞白一錢。蜜陀僧一兩。舶上硫黃一分。丁香二十一箇。右爲末。每服一字。三歲已上半錢。用乳汁或白麵湯調下。並不轉瀉。一復時取下青黑物後。服補藥。醋石榴皮半兩。炙黑色。伊祁一分。木香一分。麝香半錢。同爲末。每服一字。溫薄酒調下。併喫二服。凡小兒脇下硬如一物。乃是癖氣。俗謂之妳脾。只服溫脾化積氣丸子藥不可取。轉無不愈也。取之多失。

【雀卵】孟詵云。肉十月已後。正月已前食之。此蓋取其陰陽靜定。未決泄之義。卵亦取第一番者。

【鶴】頭無丹。項無烏帶。身如鶴者。是兼不善唳。但以喙相擊而鳴。作池養魚。虵以哺子之事。豈可垂示後世。此禽多在樓殿吻上作窠。日夕人觀之。故知其未審耳。磽石條中亦著。

【伏翼】屎合疳藥。白日亦能飛。但畏鷲鳥不敢出。此物善服氣。故能壽。冬月不食。亦可驗也。

【孔雀】尾不可入目。昏翳人眼。

【鸕鷀】陶隱居云。此鳥不卵生。口吐其鷇。今人謂之水老鴉。巢於大木。羣集。宿處有常。久則木枯。以其糞

毒也懷妊者不敢食爲其口吐其鴆陳藏器復云使易產臨時令產婦執之與陶相戾嘗官於澧州公宇後有大木一株其上有三四十巢日夕觀之既能交合兼有卵殼布地其色碧豈得鴆吐口中是全未考尋可見當日聽人之誤言也

【白鴿】其毛羽色於禽中品第最多野鴿糞一兩炒微焦麝香別研吳白朮各一分赤芍藥青木香各半兩柴胡三分延胡索一兩炒赤色去薄皮七物同爲末溫無灰酒空心調一錢服治帶下排膿候膿盡即止後服仍以他藥補血臟

【斑鳩】斑鳩也嘗養之數年並不見春秋分化有有斑者有無斑者有灰色者有小者有大者久病虛損人食之補氣雖有此數其用即一也

【鶉】有雌雄從卵生何言化生其說甚容易嘗於田野麥得其卵初生謂之雜鶉至初秋謂之旦秋中秋已後謂之白唐然一物四名當悉書之小兒患疳及下痢五色旦旦食之有效

本草衍義卷之十七

【石蜜】嘉祐本草石蜜收蟲魚部中又見果部新聿取蘇恭說直將石字不用石蜜既自有本條煎煉亦自有法今人謂之乳糖則蟲部石蜜自是差誤不當更言石蜜也本經以謂白如膏者良由是知石蜜字乃白蜜字無疑去古既遠亦文字傳寫之誤故今人尚言白沙蜜蓋經久則陳白而沙新收者惟稀而黃次條蜜蠟故須別立目蓋是蜜之房攻治亦別至如白蠟又附于蜜蠟之下此又誤矣本是續上文敍蜜蠟之用又注所出州土不當更分之爲二何者白蠟本條中蓋不言性味止是言其色白爾既有黃白三色今止言白蠟是取蠟之精英者其黃蠟直置而不言黃則蠟陳白則蠟新亦是蜜取陳蠟取新也唐注云除蜜字爲佳今詳之蜜字不可除除之卽不顯蠟自何處來山蜜多石中或古木中有經二三年或一得而取之氣味醇厚人家窠檻中蓄養者則一歲春秋二取之取之既數則蜜居房中日少氣味不足所以不逮陳白者日月足也雖收之纔過夏亦酸壞若龕於井中近水處則免湯火傷塗之痛止仍搗薤白相和雖無毒多食亦生諸風

【牡蠣】須燒爲粉用兼以麻黃根等分同搗研爲極細末粉盜汗及陰汗本方使生者則自從本方左顧經中本不言止從陶隱居說其西陽雜俎已言牡蠣言牡非爲雄也且如牡丹豈可更有牡丹也今則合於地人面向午位以牡蠣頂向子視之□□在左者爲左顧此物於無目如此焉得更有顧盼也

【桑螵蛸】自採者眞。市中所售者恐不得盡皆桑中者。蜀本圖經。浸炮之法。不若略蒸過爲佳。隣家有一男子小便日數十次。如稠米泔。色亦白。心神恍惚。瘦瘁食減。以女勞得之。令服此桑螵蛸散。未終一劑而愈。安神魂。定心志。治健忘。小便數。補心氣。桑螵蛸、遠志、菖蒲、龍骨、人參、茯神、當歸、龜甲、醋炙、已上各一兩。爲末。夜臥人參湯調下二錢。如無桑上者。卽用餘者。仍須以炙桑白皮佐之。量多少可也。蓋桑白皮行水意以接螵蛸。就腎經用桑螵蛸之意如此。然治男女虛損。益精陰。痿夢失精。遺溺。疝瘕。小便白濁。腎衰。不可闕也。

【海蛤】【文蛤】陳藏器所說是。今海中無鴈。豈有食蛤糞出者。若蛤中殼有肉時。尙可食。肉旣無。焉得更有糞。中過數多者。必爲其皆無廉稜。乃有是說。殊不知風浪日夕淘汰。故如是。治傷寒汗不溜。搐却手脚。海蛤川烏頭各一兩。川山甲二兩。爲末。酒糊爲丸大一寸許。揑褊。置所患足心下。擘葱白蓋藥。以帛纏定。於暖室中。取熱水浸脚至膝上。久則水溫。又添熱水。候遍身汗出爲度。凡一二日一次。浸脚以知爲度。

【石決明】經云味鹹。卽是肉也。人採肉以供饌。及乾致都下。北人遂爲珍味。肉與殼兩可用。方家宜審用之。然皆治目。殼研。水飛。點磨外障翳。登萊州甚多。

【眞珠】小兒驚熱藥中多用。河北塘濼中。亦有圍及寸者。色多微紅。珠母與廉州珠母不相類。但清水急流處。其色光白。水濁及不流處。其色暗。餘如經。

【秦龜】卽生於秦者。秦地山中多老龜。極大而壽。龜甲卽非止秦地有。四方皆有之。但取秦地所出大者

爲勝。今河北獨流釣臺甚多。取龜筒治療。亦入衆藥。止此二種。各逐本條。以其靈於物。方家故用以補心。然甚有驗。

【琥珀】治心經風熱。生者入藥。蓋性味全也。既入湯火中。卽不堪用。爲器物者是矣。與生熟犀其義同。

【鯉魚】至陰之物也。其鱗故三十六。陰極則陽復。所以素問曰魚熱中。王叔和曰。熱卽生風。食之所以多發風熱。諸家所解並不言。日華子云鯉魚涼。今不取。直取素問爲正。萬一風家更使食魚。則是貽禍無窮矣。

【蠶魚】今人謂之黑鯉魚。道家以謂頭有星爲厭。世有知之者。往往不敢食。又發故疾。亦須忌慎。今用之療病。亦止取其一端耳。

【鯇魚】形少類獺。有四足。腹重墜如囊。身微紫色。嘗剖之。中有三小蠏。又有四五小石塊。如指面許。小魚五七枚。然無鱗。與鮎鱔相類。今未見用者。

【鱓魚】腹下黃。世謂之黃鱓。此尤動風氣。多食令人霍亂。屢見之。向在京師。鄰舍一郎官。因食黃鱓。遂致霍亂吐利。幾至委頓。又有白鱓。稍麤大。色白。二者皆亡鱗。大者長尺餘。其形類蛇。但不能陸行。然皆動風。江陵府西有湖曰西湖。每歲夏秋沮河水漲。卽湖水滿溢。多卽復涸。土人於乾土下壜得之。每及二三尺。則有往來鱓行之路。中有泥水。水涸又下。水至復出。

【鯽魚】開其腹。內藥燒之。治齒。

【蛸皮】取乾皮、兼刺用刺作刷。治絍帛絕佳。此物兼治胃逆開胃氣有功。從虫從胃有埋焉。膽治鷹食病。世有養者去而復來。久亦不去。當縮身藏足之時。人溺之即開。合穿山甲等分燒存性。治痔。人肉豆寇一半末之。空肚熱米飲調二錢服。隱居所說。跳入虎耳及仰腹受啄之事。唐本注見摭。亦當然。

【石龍子】蜥蜴也。今人但呼爲蜴蜥。大者長七八寸。身有金碧色。仁廟朝有一蜥蜴在右掖門西濬溝中。此眞是蜥蜴也。鄭狀元有詩。有樵者於澗下行。見一蜥蜴自石罅中出。飲水訖而入。良久。凡百十次。尙不已。樵者疑不免。礪石視之。有冰雹一二升。樵人訝而去。行方三五里。大雨至。良久風雹暴作。今之州縣依法用此祈雨。經云治五癰。破石淋。利水道。亦此義乎。

【露蜂房】有兩種。一種小而其色淡黃。窠長六七寸。至一尺者。闊二三寸。如蜜脾下垂。一邊是房。多在叢木鬱翳之中。世謂之牛舌蜂。又一種或在高木上。或屋之下。外作固如三四斛許。小者亦一二斗。中有窠。如瓠之狀。由此得名。蜂色亦黃。其形大於諸蜂。世謂之玄瓠蜂。蜀本圖經言十一月十二月採者。應避生息之時也。今人用露蜂房兼用此兩種。

【槔雞】東西京界尤多。形類蠶蛾。但頭足微黑。翅兩重。外一重灰色。下一重深紅。五色皆具。腹大。此即槔雞也。今人又用之。行瘀血月閉。

【蚱蟬】夏月身與聲皆大者是。始終一般聲。仍皆乘昏夜方出土中。昇高處。背殼坼蟬出。所以皆夜出者。一以畏人。二畏日炙。乾其殼而不能蛻也。至時寒則墜地。小兒蓄之。雖數日亦不須食。古人以爲飲風露。

信有之蓋不糞而溺亦可見矣西川有蟬花乃是蟬在殼中不出而化爲花自項中出又殼治目昏翳又水煎殼汁治小兒出瘡瘢不快甚良

【白殭蠶】然蠶有兩三番惟頭番殭蠶最佳大而無蛆治小兒驚風白殭蠶蝎梢等分天雄尖附子尖共一錢微炮過爲細末每服一字或半錢以生薑溫水調灌之其蠶蛾則第二番者以其敏於生育

【木蝨】大小有三種蜚蝨今人多用之大如蜜蜂腹凹褊微黃綠色雄霸州順安軍泌塘濼界河甚多以其惟食牛馬等血故治瘀血血閉

【蜚蠊】今人謂之簸箕蟲爲其像形也乳脈不行研一枚水半合濾清服勿使服藥人知

【蠐螬】此蟲諸腐木根下有之構木津甘故根下多有此蟲其木身未有完者亦有生於糞土中者雖肥大但腹中黑不若木中者雖瘦而稍白生研水絞汁濾清飲下故【蛞蝓】【蝸牛】二物矣蛞蝓其身肉止一段蝸牛背上別有肉以負殼行顯然異矣若爲一物經中焉得分爲二條也其治療亦大同小異故知別類又謂蛞蝓是蝸牛之老者甚無謂蛞蝓有二角蝸牛四角兼背有附殼肉豈得爲一物也

【水蛭】陳藏器日華子所說備矣大者京師又謂之馬鰲腹黃者謂之馬黃長鹽然治傷折有功經與注皆不言脩製宜子細不可忽也今人用者皆炒

【鼈甲】九肋者佳煮熟者不如生得者仍以醯醋炙黃色用經中不言治勞惟蜀本藥性論云治勞瘦除骨熱後人遂用之然甚有據亦不可過劑頭血塗脫肛又燒頭灰亦治

【烏賊魚】乾置四方人炙食之。又取骨鏤爲細研細。水飛澄下。比去水日乾之。熟蜜和。得所點目中翳。緩取效。

【蝌】伊洛絕少。今多自京師來。京師亦自河北置之。今河北沿邊滄瀛州等處所出甚多。徐州亦有。但不及河北者。小兒解臚以鰲幷白及爛搗塗顖上。臚合。此物極動風。體有風疾人不可食。屢見其事。河北人取之。當八九月蝌浪之時。直於塘濼岸上。伺其出水而拾之。又夜則以燈火照捕。始得之。時黃與白滿殼。凡收藏十數日。不死亦不食。此物每至夏末秋初。則如蟬蛻解。當日名蝌之意。必取此義。

【原蠶蛾】有原復敏速之義。此則第二番蛾也。白殭蠶條中已具。屎飼牛代穀。又以三升醇酒拌蠶屎五斗。用甑蒸熟。於暖室中。鋪於油單上。令患風冷氣閉及近感癱風人。就所患一邊臥。看溫熱厚蓋覆。汗出爲度。若虛人須常在左右。防大熱昏冒。仍令頭而在外。不得壅覆。未全愈間再作。

【蠶退】治婦人血風。此則眠起時所蛻皮是也。其蠶退紙。謂之蠶連。亦燒灰用之。治婦人血露。

【鰻鱺魚】生剖瞥乾。取少許。火上微炙。候油出。塗白剝用以指擦之。即時色轉。凡如此五七次。用即愈。仍先於白處微微擦動。

【鮫魚】沙魚皮。一等形稍異。今人取皮飾鞍劍。餘如經。

【河鮎】經言無毒。此魚實有大毒。味雖珍。然脩治不如法。食之殺人。不可不謹也。厚生者不食。亦好。蘇子美云河鮎于此時貴。不數魚蝦。此即詩家鄙諷之言。未足全信也。然此物多怒。觸之則怒氣滿腹。飜浮水

上。漁人就以物撩之。遂爲人獲。橄欖幷蘆根汁解其毒。

【紫貝】大二三寸。背上深紫有點、但黑。本經以此燒存性入點眼藥。

【鱸魚】益肝腎。補五藏。和腸胃。食之宜人。不甚發病。宜然張翰思之也。

【蝦蟆】多在人家渠塹下。大腹品類中最大者是。遇陰雨、或昏夜卽出食。取眉間有白汁。謂之蟾酥。以油單裹眉裂之。酥出單上。入藥用。有人病齒縫中血出。以紙紲子。蘸乾蟾酥少許。於血出處按之。立止。世有人收三足枯蟾以罔衆。但以水沃半日。盡見其僞。蓋本無三足者。

【黽】音蛙。其色青。腹細紫尖。後脚長。故善躍。大其聲則曰蛙。小其聲則曰蛤。月令所謂雀入大水化爲蛤者也。唐韓退之詩一夜青蛙啼到曉者是。此食之性平。解勞熱。

【蛤蚧】補肺虛勞嗽有功。治久嗽不愈。肺間積虛熱。久則成瘡。故嗽出膿血。曉夕不止。喉中氣塞。胸膈噎痛。蛤蚧、阿膠、生犀角、鹿角膠、羚羊角、各一兩。除膠外、皆爲屑。次入膠。分四服。每服用河水三升。於銀石器中慢火煮至半升。濾去滓。臨臥微溫。細細呷其滓。候服盡再搥。都作一服。以水三升煎至半升。如前服。若病人久虛不喜水。當漸減水。張刑部子皐病極。田樞密況送此方。遂愈。

【鯪鯉甲】穴山而居。亦能水燒一兩存性。肉荳蔻仁三箇。同爲末。米飲調二錢服。治氣痔。膿血甚者加蝟皮一兩。燒入。中病卽已。不必盡劑。

【蜘蛛】品亦多。皆有毒。經不言用是何種。今人多用人家簷角、籬頭、陋巷之間。空中作圓網。大腹、深灰色者。遺尿着人。作瘡癬。

【蜻蛉】其中一種最大。京師名爲馬大頭者是。身綠色。雌者。腰間一遭碧色。用則當用雄者。陶隱居以謂青色大眼。一類之中。元無青者。眼一類皆大。此物生化於水中。故多飛水上。唐杜甫云點水蜻蜓款款飛。

【石蠶】謂之爲草則繆矣。經言肉解結氣。注中更辯不定此物在處。有附生水中石上。作絲甕如釵股長寸許。以蔽其身。色如泥。蠶在其中。此所以謂之石蠶也。今方家用者絕稀。此亦水中虫耳。山河中多。

【蛇蛻】從口飜退出。眼睛亦退。今合眼藥多用。取此義也。入藥洗淨。

【蛇黃】椎破。中間有如自然銅者佳。治心悸動火。燒赤、酒焠至酥二兩、朱砂一兩、與蛇黃同研、水飛。天麻二兩別爲末。與前二味合均。每以半錢。少以薄荷湯調。食後夜臥服。殊效。

【金蛇】今方書往往不見用。

【烏蛇】尾細長。能穿小銅錢一百文者、佳。有身長一丈餘者。蛇類中此蛇入藥最多。嘗於順安軍塘濼堤上見一烏蛇。長一丈餘。有鼠狼嚙蛇頭曳之而去。是亦相畏伏爾。市者多僞以佗蛇燻黑色貨之。不可不察也。烏蛇脊高。世謂之劍脊烏梢。

【白花蛇】諸蛇鼻向下。獨此蛇鼻向上。背有方勝花紋。以此得名。用之去頭尾。換酒浸三日。棄酒不用。火炙。仍盡去皮骨。此物毒甚。不可不防也。

【蜈蚣】背光黑綠色。足赤腹下黃。有中其毒者。以烏雞屎水稠調塗咬處效。大蒜塗之亦效。復能治丹毒瘤。蜈蚣一條乾者。白礬皂子大。雷丸一箇。百步二錢。秤同爲末。醋調塗之。又畏蛞蝓。不敢過所行之路。觸其身則蜈蚣死。人故取以治蜈蚣毒。桑汁白鹽亦效。

【馬陸】卽今百節蟲也。身如槎節。卽有細蹙紋起。紫黑色。光潤。百足。死則側臥。如環。長二三寸。尤者麤如小指。西京上陽宮及內城搏壻中甚多。入藥至鮮。

【蠷】噎【螵】烏紅。諸家所論備矣。然終不敢捨詩之意。嘗析窠而視之。果有子。如半粟米大。其色白而微黃。所負蟲亦在其中。乃青菜蟲。却在子下。不與蟲相着。又非葉蟲及草上青蟲。應是諸蟲皆可也。陶隱居所說近之矣。人取此房。研細。醋調塗蜂螫。

【雀瓮】多在棘枝上。故又名棘剛子。研其間蟲汁。嚯小兒治。

【鼠婦】此濕生蟲也。多足。其色如蚓。背有橫紋蹙起。大者長三四分。在處有之。搏甃及下濕處多。用處絕少。

【螢】常在大暑前後飛出。是得大火之氣而化。故如此明照也。今人用者少。月令雖曰腐草所化。然非陰濕處終無。

【衣魚】多在故書中。久不動。帛中或有之。不若故紙中多也。身有厚粉。手搯之則落。亦嚙毳衣。用處亦少。

其形稍似魚。其尾又分二歧。世用以滅瘢痕。

【白頸蚯蚓】自死者良。然亦應候而鳴。此物有毒。昔有病腹大。夜聞蚯蚓鳴於身。有人教用鹽水浸之而愈。崇寧末年。隴州兵士暑月中在倅廳前跣立廳下。爲蚯蚓所中。遂不救。後數日又有人被其毒。博識者教以先飲鹽湯一盃。次以鹽湯浸足。乃愈。今入藥。當去土了微炙。若治腎臟風下痓病。不可闕也。仍須鹽湯送。王荊公所謂糞壤太牢俱有味。可能蚯蚓獨清廉者也。

【螻蛄】螻【蛄】姑。此蟲當立夏後至夜則鳴。月令謂之螻蟈鳴者是矣。其聲如蚯蚓。此乃是五伎而無一長者。

【蟋蟀】大小二種。一種大者爲胡蟋蟀。身黑光。腹翼下有小黃子附母而飛行。晝不出。夜方飛出。至人家庭戶中。見燈光則來。一種小者。身黑暗。晝方飛出。夜不出。今當用胡蟋蟀。其小者研三十枚。以水灌牛馬。治脹結。絕佳。狐遇而必盡食之。

【斑猫】須糯米中炒。米黃爲度。妊身人不可服。爲能潰人肉。治淋藥多用。極苦。人尤宜斟酌。下條芫青。其用與此不相遠。故附于此。

【馬刀】京師謂之烏岸。春夏人多食。然發風痰。性微冷。又順安軍界河中亦出。蜄大底。與馬刀相類。肉頗澹。人作鮓以寄隣左。又不能致遠。亦發風。此等皆不可多食。今蛤粉皆此等衆蛤灰也。

【貝子】今謂之貝齒。亦如紫貝。但長寸餘。故曰貝子。色微白。有深紫黑者。治目中翳。燒用。北人用之氈帽

上爲飾。及綴衣。或作蹀躞下垂。

【甲香】善能管香煙。與沉檀龍麝用之。甚佳。

【蝎】大人小兒通用。治小兒驚風。不可闕也。有用全者。有只用梢者。梢力尤劣。今青州山中石下捕得。慢火逼或炙日中曬。蝎渴熱時。乃與青泥食之。既滿。復以火逼殺之。故其色多赤。欲其體重而售之。故也。醫家用之。皆悉去土。如螫人還能禁止之。自嘗破其毒。兒長禁而止。及令。故蜇終不痛。翰林禁科具矣。

【五靈脂】行經血有功。不能生血。嘗有人病眼中翳。往來不定。如此乃是血所病也。蓋心生血。肝藏血。肝受血則能視。目病不治血爲背理。此物入肝最速。一法五靈脂二兩、沒藥一兩、乳香半兩、川烏頭一兩半。炮去皮。同爲末。滴水丸如彈子大。每用一丸。生薑溫酒磨服。治風冷氣血閉。手足身體疼痛冷麻。又有人被毒蛇所傷。良久之間已昏困。有老僧以酒調藥二錢灌之。遂蘇。及以藥滓塗咬處。良久復灌二錢。其苦皆去。問之。乃五靈脂一兩、雄黃半兩同爲末。止此耳。後有中毒者用之。無不驗。此藥雖不甚貴。然亦多有僞者。

本草衍義卷之十八

【豆蔻】草豆蔻也。氣味極辛。微香。此是對肉豆蔻而名之。若作果。則味不和。不知前人之意。編入果部。有何意義。性溫而調。散冷氣力甚速。花性熱。淹置京師。然味不甚美。微苦。必爲能消酒毒。故爲果。花乾則色淡紫。

【葡萄】先朝西夏持師子來獻。使人兼賫葡萄遺州郡。比中國者皆相似。最難乾。不乾不可收。仍酸澀不可食。李白所謂胡人歲獻葡萄酒者是此。療疱不出。食之盡出。多食皆昏人眼。波斯國所出。大者如雞卵。

【蓬藁】非覆盆也。自別是一種。雖枯敗而枝梗不散。今人不見用。此卽賈山策中所言者是此。

【覆盆子】長條。四五月紅熟。秦州甚多。永興華州亦有。及時山中人採來賣。其味酸甘。外如荔枝。櫻桃許大。軟紅可愛。失採則就枝生蛆。益腎藏。縮小便。服之。當覆其溺器。如此取名。食之多熱。取時五六分。熱便可採。烈日曝。仍須薄綿蒙之。今人取汁作煎爲果。仍少加蜜。或熬爲稀湯。點服。治肺虛寒。採時着水則不堪煎。

【大棗】今先青州。次晉州。此二等可曝入藥。益脾胃。爲佳。餘止可充食用。又云御棗甘美輕脆。後衆棗熟。以其甘故多生蟲。今人所謂僕落酥者是。又有牙棗。先衆棗熟。亦甘美。但微酸。尖長。此二等止堪啗。不堪收曝。今人將乾棗去核。於鐺鍋中微火縷遍。乾爲末。量多少。入生薑末爲湯。點服。調和胃氣。又將煮棗

肉和治脾胃丸藥尤佳。人青州棗去皮核。焙乾爲棗圈。達都下爲奇果。

【雞頭實】今天下皆有之。河北沿淸濼居人採得。春去皮。搗以爲粉。蒸溲作餅。可以代糧。食多不益脾胃氣。兼難消化。

【藕實】就蓬中乾者爲石蓮子。取其肉。於砂盆中。乾擦去浮上赤色。留靑心爲末。少入龍腦爲湯。點寧心志。淸神。然亦有粉。紅千葉白千葉者。皆不實。如此是有四等也。其根惟白蓮爲佳。今禁中又生白蓮。亦一瑞也。

【芰】今世俗謂之菱角。所在有。煮熟取仁食之。代糧。不益脾。又有水菱亦芰也。但大而脆。可生食。和合治療。未聞其用。有人食生芰多則利及難化。是亦性冷。

【栗】欲乾莫如曝。欲生收莫如潤。沙中藏至春末夏初。尙如初收摘。小兒不可多食。生者難化。熟卽滯氣。隔食。生蟲。往往致小兒病。人亦不知。所謂補腎氣者。以其味鹹。又滯其氣爾。湖北路有一種栗。頂圓末尖。謂之旋栗。圖經引詩言莘（音秦）栗者。謂其象形也。

【櫻桃】孟詵以爲櫻非桃類。然非桃類。蓋其以形肖桃。故曰櫻桃。又何疑焉。謂如木猴梨葫桃之類。亦取其形相似爾。古謂之唅桃。可薦宗廟。禮云先薦寢廟者是此。唐王維詩云。纔是寢園春薦熟。非干御苑鳥啣殘。小兒食之。纔過多無不作熱。此果在三月末四月初間熟。得正陽之氣。先諸果熟。性故熱。今西洛一種紫櫻。正熟時正紫色。皮裏間有細碎黃點。此最珍也。今亦上供朝廷。藥中不甚須。

【橘柚】自是兩種。故曰一名橘皮。是元無柚字也。豈有兩等之物。而治療無一字別者。即知柚字爲誤。後人不深求其意。謂柚字所惑。妄生分別。亦以過矣。且青橘與黃橘治療尙別。矧柚爲別種也。郭璞云柚似橙而大於橘。此卽是識橘柚者也。今若不如此言之。恐後世亦以柚皮爲橘皮。是貽無窮之患矣。去古既遠。後之賢者亦可以意逆之耳。橘惟用皮與核。皮天下甚所須也。仍湯浸去穰。餘如經。與注。核皮二者須自收爲佳。有人患氣嗽將期。或教以橘皮生薑焙乾。神麴等分爲末。丸桐子大。食後夜臥。米飮服三五十丸。兼舊患膀胱。緣服此偕愈。然亦取其陳皮入藥。此六陳中一陳也。腎疰、腰痛、膀胱氣痛。微炒核去殼爲末。酒調服。愈。

【乳柑子】今人多作橘皮。售於人。不可不擇也。柑皮不甚苦。橘皮極苦。至熟亦苦。若以皮緊慢分別橘與柑。又緣方宜各不同。亦互有緊慢者。脾腎冷人食其肉。多致藏寒或洩利。

【橙子皮】今人止以爲果。或取皮合湯待賓。未見入藥。宿酒未醒。食之速醒。

【梅實】食梅則津液泄。水生木也。津液泄。故傷齒腎屬水。外無齒。故也。王叔和曰。膀胱腎合爲津廔。此語雖鄙。然理存焉。燻之爲烏梅。曝乾藏密器中。爲白梅。

【枇杷葉】江東西湖南北二川皆有之。以其形如琵琶。故名之。治肺熱嗽有功。花白、最先春也。子大如彈丸。四五月熟。色若黃杏。微有毛、肉薄、性亦平。與葉不同。有婦人患肺熱、久嗽、身如炙。肌瘦將成肺數。以枇杷葉、木通、款冬花、紫苑、杏仁、桑白皮各等分。大黃減半。各如常製。治訖。同爲末。蜜丸。如櫻桃大。食後夜臥。

各啗化一丸。未終劑而愈。

【柿】有着蓋柿。於蔕下別生一重。又牛心柿。如牛之心。蒸餅柿。如今之市買蒸餅。華州有一等朱柿。比諸品中最小。深紅色。又一種瑞柿。亦大於諸柿。性皆涼。不至大寒。食之引痰。極甘。故如是去皮、掛大木株上。使風日中自乾。食之多動風火。乾者味不佳。生則澀。以溫水養之。需澀去可食。逮至自然紅爛。澀亦自去。乾則性平。

【木賊】得木之正。故入筋。以鉛霜塗之。則失醋味。受金之制。故如是。今人多取西京大木瓜爲佳。其味和美至熟止。青白色。入藥、絕有功。勝宣州者味淡。此物入肝。故益筋。與血病。腰腎脚膝無力。此物不可闕也。

【甘蔗】今川廣、湖南北、二浙、江東西皆有。自八九月已堪食。收至三四月。方酸壞。石蜜、沙糖、糖霜、皆自此出。惟川浙者爲勝。

【石蜜】川浙最佳。其味厚。其他次之。煎煉成。以鉶象物。達京都。至夏月及久陰雨。多自消化。土人先以竹葉及紙裹。外用石灰埋之。仍不得見風。遂免。今人謂乳糖。其作餅黃白色者。今人又謂之捻糖。易消化。入藥至少。

【沙糖】又次石蜜。蔗汁清。故費煎煉。致紫黑色。治心肺大腸熱。兼噉駝馬。今醫家治暴熱。多以此物爲先導。小兒多食則損齒。土制水也。及生蛀蟲。裸蟲屬土。故因甘遂生。

【芋】所在有之。江浙二川者。最大而長。京洛者。差圓小。而惟東西京者佳。他處味不及也。當心出苗者爲

芋頭四邊附芋頭而生者爲芋子八九月已後可食至時掘出置十數日却以好土勻埋至春猶好生則辛而涎多食滯氣困脾唐杜甫詩曰園收芋栗不全貧者是此以梗擦蜂螫處愈

【烏芋】今人謂之荸薺皮厚色黑肉硬白者謂之猪荸薺皮薄澤色淡紫肉軟者謂之羊荸薺正二月人採食之此二等藥罕用荒歲人多採以充糧

【荔枝】藥品中今未見用惟崔元亮方中收之果實中爲上品多食亦令人發虛熱此物喜雙實尤可愛宋朝有蔡君謨荔枝譜其說甚詳唐杜牧詩云一騎紅塵妃子笑無人知是荔枝來此是川蜀荔枝亦可生置之長安也以核熁火中燒存性爲末新酒調一枚末服治心痛及小腸氣

【杏核仁】犬傷人量所傷大小爛嚼沃破處以帛繫定至差無苦又湯去皮研一升以水一升半攪復絞取稠汁入生蜜四兩甘草一莖約一錢銀石器中熁火熬成稀膏盛器盛食後夜臥入少酥沸湯點一匙匕服治肺燥喘熱大腸秘潤澤五藏如無上證更入鹽點尤佳

【杏實】本經別無治療日華子言多食傷神有數種皆熱小兒尤不可食多致瘡癰及上膈熱瞲蓄爲乾果其深赭色核大而褊者爲金杏此等須接其他皆不逮也如山杏輩只可收仁又有白杏至熟色青白或微黃其味甘淡而不酸

【桃核仁】桃品亦多京畿有白桃光小於衆桃不益脾有赤點斑而光如塗油山中一種正是月令中桃始華者但花多子少不堪啗惟堪取仁唐文選謂山桃發紅萼者是矣又太原有金桃色深黃西京有崑

崙桃肉深紫紅色此二種尤甘又餅子桃如今之香餅子如此數種入藥惟以山中自生者爲正蓋取走泄爲用不取肥好者如傷寒八九日間發熱如狂不解小腹滿痛有瘀血用桃仁三十箇湯去皮尖麩炒赤色別研蟲蟲三十枚去翅水蛭二十枚各炒川大黃一兩同爲末再與桃仁同擣令勻煉蜜丸如小豆大每服二十丸桃仁湯下利下瘀血惡物便愈未利再服

【獼猴桃】今永興軍南山甚多食之解實熱過多則令人藏寒洩十月爛熟色淡綠生則極酸子繁細其色如芥子枝條柔弱高二三丈多附木而生沒山傍道則有存者深山則多爲猴所食

【胡桃】發風陝洛之間甚多外有青皮包之胡桃乃核也核中穰爲胡桃肉雖如此說用時須以湯剝去肉上薄皮過夏至則不堪食有人患酒痳風鼻上赤將橘子核微炒爲末每用一錢匕研胡桃肉一箇同以溫酒調服以知爲度

【李核仁】其窠大者高及丈今醫家少用實合漿水食令人霍亂澀氣而然今畿內小窰鎮一種最佳堪入貢又有御李子如櫻桃許大紅黃色先諸李熟此李品甚多然天下皆有之所以比賢士大夫盛德及天下者如桃李無處不芬芳也別本注云有野李味苦名郁李子取仁入藥此自是郁李仁別是一種在木部第十四卷非野李也

【梨】多食則動脾少則不及病用梨之意須當斟酌惟病酒煩渴人食之甚佳終不能却疾

【菴羅果】西洛甚多亦梨之類也其狀亦梨先諸梨熟七夕前後已堪啗色黃如鵝梨纔熟便鬆軟入藥

絕稀用。

【安石榴】有酸淡兩種。旋開單葉花。旋結實。實中子紅。孫枝甚多。秋後經雨。則自坼列。道家謂之三尸酒。云三尸得此果則醉。河陰縣最多。又有一種子白瑩徹如水晶者。味亦甘。謂之水晶石榴。惟酸石榴皮。合斷下藥。仍須老不所結。及收之陳久者佳。微炙爲末。以燒粟米飯爲丸。梧子大。食前熱米飲下三十至五十丸。以知爲度。如寒滑。加附子赤石脂各一倍。

【橄欖】味澀。食久則甘。嚼汁嚥。治魚鯁。

【榲桲】食之須淨去上浮毛。不爾損人肺。花亦香。白色。諸果中惟此多生蟲。少有不蚵者。圖經言。欲臥嗽一兩枚而寢。如此恐太多。痞塞胃脘。

本草衍義卷之十九

【白瓜子】實。冬瓜仁也。服食中亦稀用。

【白冬瓜】一二斗許大。冬月收爲菜。壓去汁。蜜煎代果。患發背及一切癰疽。削一大塊置瘡上。熱則易之。分散熱毒氣甚良。

【瓜蔕】此卽甜瓜蔕也。去瓜皮。用蔕約半寸許。曝極乾。不限多少。爲細末。量疾。每用一二錢匕。臘粉一錢匕。以水半合同調勻。灌之。治風涎暴作。氣塞倒臥。服之良久。涎自出。或覺有涎。用諸藥行化不下。但如此服。涎卽出。或服藥良久。涎未出。含沙糖一塊。下咽。卽涎出。此物甚不損人。全勝石碌硇砂輩。

【甜瓜】暑月服之。永不中暑氣。多食未有不下利者。貧下多食。至深秋作痢爲難治。爲其消損陽氣故也。亦可以如白冬瓜煎漬收。

【冬葵子】葵菜子也。四方皆有。苗性滑利。不益人。患癰瘇毒熱內攻。未出膿者。水吞三五枚。遂作竅。膿出。

【蜀葵】四時取紅單葉者。根陰乾。治帶下排膿血惡物。極有驗。

【黃蜀葵花】與蜀葵別種。非爲蜀葵中黃者也。葉心下有紫檀色。摘之。剔爲數處。就日乾之。不爾。卽浥爛。瘡家爲要藥。子臨產時。取四十九粒。研爛。用溫水調服。良久。產。

【莧實】入藥亦稀。苗又謂之人莧。人多食之。莖高而葉紅黃二色者。謂之紅人莧。可淹菜用。

【苦菜】四方皆有。在北道則冬方彫斃。生南方則冬夏常青。此月令小滿節後。所謂苦菜秀者是此。葉如苦葉。更狹。其綠色差淡。折之白乳汁出。常常點瘊子自落。味苦。花與野菊相似。春夏秋皆旋開。花去中熱。安心神。

【萵苣】今菜中惟此。自初生便堪生啗。四方皆有。多食昏人眼。蛇亦畏之。蟲入耳。以汁滴耳中。蟲出。諸蟲不敢食其葉。以其心置耳中。留蟲出路。蟲亦出。有人自長立禁此一物不敢食。至老目不昏。苦苣擣汁。傅丁瘡殊驗。青苗陰乾。以備冬月。爲末。水調傅亦可。

【蕪菁】【蘆菔】二菜也。蘆菔。卽蘿蔔也。蕪菁。今世俗謂之蔓菁。夏則枯。當此之時。蔬圃中復種之。謂之雞毛菜。食心正在春時。諸菜之中。有益無損。於世有功。採擷之餘。收子爲油。根過食動氣。河東太原所出極大。他處不及也。又出吐谷渾。後於菜菔條中。爾雅釋。但名蘆菔。今謂之蘿蔔是也。則蕪菁條中。不合更言及蘆菔二字。顯見重復。從爾雅爲正。

【菜菔根】卽前條所謂蘆菔。今人止謂之蘿蔔。河北甚多。登萊亦好。服地黃何首烏。人食之。則令人髭髮白。世皆言草木中。惟此下氣速者。爲其辛也。不然。如生薑芥子又辛也。何止能散而已。菜菔辛而又甘。故能散緩。而又下氣速也。散氣用生薑。下氣用菜菔。

【菘菜】張仲景傷寒論。凡用甘草。皆禁菘菜者是此。菘菜也。葉如蕪菁。綠色。差淡。其味微苦。葉嫩。稍闊。不益中。虛人食之覺冷。

【芥】似蕪菁葉上紋皺起色尤深綠爲異子與苗皆辛子尤甚多食動風一品紫芥與此無異紫色可愛人多食之然亦動風又白芥子比諸芥稍大其色白入藥用

【苜蓿】唐李白詩云天馬常啣苜蓿花是此陝西甚多飼牛馬嫩時人兼食之微甘淡不可多食利大小腸有宿根刈訖又生

【蓼實】即神農本經第十一卷中水蓼之子也彼言蓼則用莖此言實即用子故此復論子之功故分爲二條春初以葫蘆盛水浸濕高掛於火上晝夜使煖遂生紅芽取以爲蔬以備五辛盤又一種水紅與此相類但苗莖高及丈取子微炒碾爲細末薄酒調二三錢服治瘵癰久則效效則已

【葱實】葱初生名葱針至夏則有花於秋月植作高溝壠旋壅起以備冬用曰冬葱其實一也又有龍角葱每莖上出歧如角皮赤者名樓葱可煎湯涤下部子皆辛色黑有皺紋作三瓣此物大底以發散爲功多食昏人神

【薤】葉如金燈葉差狹而更光故古人言薤露者以其光滑難竚之義千金治肺氣喘急用薤白亦取其滑泄也與蜜同搗塗湯火傷效甚速

【韭】春食則香夏食則臭多食則昏神子止精滑甚良未出糞土爲韭黃最不益人食之即滯氣蓋啥噎鬱未之氣故如是孔子曰不時不食正爲此輩花食之動風

【白蘘荷】八九月間淹貯之以備冬月作蔬果治療只用生者

【蘇】此紫蘇也。背面皆紫者佳。其味微辛甘。能散其氣。香。今人朝暮湯其汁飲。爲無益。醫家以謂芳草。致豪貴之疾者。此有一焉。脾胃寒人。飲之多泄滑。往往不覺。子治肺氣喘急。

【水蘇】氣味與紫蘇不同。辛而不和。然一如蘇。但面不紫。及周圍槎牙如鴈齒。香少。

【假蘇】荆芥也。只用穗。治產後血暈及中風。目帶上。四肢強直。爲末。二三錢。童子小便一小盞。調下嚥。良久。卽活。甚有驗。又治頭目風。荆芥穗。細辛。川芎。等爲末。飯後湯點二錢。風搔遍身。濃煎湯淋漆。或坐湯中。

【香薷】生山野。荆湖南北二川皆有。兩京作圃種。暑月亦作蔬菜。治霍亂。不可闕也。用之無不效。葉如茵蔯花。葉紫。在一邊成穗。凡四五十房。爲一穗。如荆芥穗。別是一種香。餘如經。

【薄荷】世謂之南薄荷。爲有一種龍腦薄荷。故言南以別之。小兒驚風壯熱。須此引藥。猫食之卽醉。物相感爾。治骨蒸熱勞。用其汁。與衆藥熬爲膏。

【蘩蔞】音縷。雞腸草。一物也。今雖分之爲二。其雞腸草條中。獨不言性味。故知一物也。雞腸草。春開小花如菉豆大。葉如園荽。初生則直。長大卽覆地。小戶收之爲齏。食之烏髭髮。

【葫】大蒜也。其氣極葷。然置臭肉中。掩臭氣。中暑毒人。爛嚼三兩瓣。以溫水送之。下嚥。卽知。仍禁飲冷水。又患暴下血。以葫五七枚。去梗皮。量多少入豆豉。搗爲膏。可丸卽丸梧子大。以米飲下五六十丸。無不愈者。人鼻衄爛研一顆。塗兩足心下。纔止便拭去。又將紫皮者。橫切作片子。厚一分。初患瘡發於背脇間。未

辨癰疽者。若陽滯於陰。卽爲癰。陰滯於陽。卽爲疽。癰卽皮光赤。疽卽皮肉紋起不澤。並以葫片覆之。用艾炙。如已痛。炙之不痛。如不痛。炙至痛。初覺卽便炙。無不效者。仍審度正於中心貼葫。炙之。世人往往不晤此瘡。初見其瘡小。不肯炙。惜哉。

【蒜】小蒜也。又謂之葍。苗如葱。針根白。木者如烏芋子。兼根煮食之。又謂之宅蒜。華佗用蒜齏。是此物。

【芸薹】不甚香。經多根不死。辟蠹於諸菜中。亦不甚佳。

【茄子】新羅國出一種。淡光微紫色。形長味甘。今其子已遍中國蔬圃中。惟此無益。並無所治。止說損人。後人雖有處治之法。然終與本經相失。圃人又植於暖處。厚加糞壤。遂於小滿前後。求貴價以售。既不以時損人益多。不時不食。烏可忽也。

【馬齒莧】人多食之。然性寒滑。青黛條中已著。

本草衍義卷之二十

【胡麻】諸家之說參差不一。止是今脂麻。更無他義。蓋其種出於大宛。故言胡麻。今胡地所出者。皆肥大。其紋鵲。其色紫黑。故如此區別。取油亦多。故詩云。松下飣胡麻。此乃是所食之穀無疑。與白油麻爲一等。如川大黃。川當歸。川升麻。上黨人參。齊州半夏之類。不可與他土者更爲一物。蓋特以其地之所宜立名也。是知胡麻與白油麻爲一物。嘗官於順安軍雄霸州之間。備見之。又二條皆言無毒。治療大同。今之用白油麻世不可一日闕也。然亦不至於大寒。宜兩審之。

【青囊】音箱。卽油麻葉也。陶隱居注。亦曰胡麻葉也。胡地脂麻鵲色。子頗大。日華子云。葉作湯沐。潤毛髮。乃是今人所取胡麻葉。以湯浸之。良久。涎出。湯遂稠黃色。婦人用之梳髮。由是言之。胡麻與白油麻。今之所謂脂麻者是矣。青囊卽其葉無疑。

【大麻子】海東來者最勝。大如蓮實。出毛羅島。其次出上郡北地。大如豆。南地者子小。去殼法。取麻子帛包之。沸湯中浸。湯冷出之。垂井中一夜。勿令着水。次日日中曝乾。就新瓦上挼去殼。簸揚取仁。粒粒皆完。張仲景麻仁丸。是用此大麻子。

【白油麻】與胡麻一等。但以其色言之。比胡麻差淡。亦不全白。今人止謂之脂麻。前條已具。炒熟。乘熱壓

出油。而謂之生油。但可點照。須再煎煉。方謂之熟油。始可食。復不中點照。亦一異也。如鐵自火中出。而謂之生鐵。亦此義耳。

【飴糖】卽糗是也。多食動脾風。今醫家用以和藥。糯與粟米作者佳。餘不堪用。蜀黍米亦可造。不思食人少食之。亦使脾胃氣和。唐白樂天詩。一榛較牙糗者。是此。

【生大豆】有綠褐黑三種。亦有大小兩等。其大者。出江浙湖南北。黑小者生他處。今用小者。力更佳。炒熟以棗肉同搗之。爲麴。代糧。又治產後百病。血熱。幷中風疾痱。止痛。背強口噤。但煩熱瘈瘲。若渴。身背腫。劇嘔噦。大豆五升。急水淘淨。無灰酒一斗。熬豆令微煙出。傾入酒瓶中。沃之。經一日已上。服酒一升。取差爲度。如素不飲酒。卽量多少服。若口噤。卽加獨活半斤。微微椎破。同沃。仍增酒至一斗二升。暑月旋作。恐酸壞。又可磴爲腐食之。

【赤小豆】食之行小便。久則虛人。令人黑、瘦枯燥。關西湖北京東西多食之。花治宿酒渴病。

【大麥】性平涼。有人患纏喉風。食不能下。將此麪作稀糊。令嚥之。旣滑膩。容易下嚥。以助胃氣。三伏中朝廷作麴。以賜臣下。作蘗造糗。

【青黃白粱米】此三種。食之不及黃粱。青白二種。性皆微涼。獨黃粱性甘平。豈非得土之中和氣多邪。今黃白二種。西洛間農家多種爲飣。尤佳。餘用則不相宜。然其粒尖小。於他穀收實少。故能種者亦稀。白色者味淡。

【粟米】利小便。故益脾胃。

【丹黍米】黍皮赤。其米黃。惟可爲糜。不堪爲飣。黏着難解。然亦動風。

【蘗米】此則粟蘗也。今穀神散中用之。性又溫於大麥。

【秫米】初搗出。淡黃白色。經久色如糯。或作酒者是此。米亦不堪爲飣。最黏。故宜酒。

【陳廩米】今經與諸家注說。皆不言是秫米爲復是粟米。然秫粟二米。陳者性皆冷。頻食之。令人自利。與經所說稍戾。煎煮亦無膏膩入藥者。今人多用新粟米。至如舂杵頭細糠。又復不言新陳秫粟。然皆不及新稍粟二糟。陳則氣味已腐敗。

【酒】呂氏春秋曰儀狄造酒。戰國策曰帝女儀狄造酒。進之於禹。然本草中已著酒名。信非儀狄明矣。又讀素問首言以妄爲常。以酒爲漿。如此則酒自黃帝始。非儀狄也。古方用酒有醇酒。春酒。社壇餘胙酒。槽下酒。白酒。青酒。好酒。美酒。葡萄酒。秫黍酒。秫酒。蜜酒。有灰酒。新熟無灰酒。地黃酒。今有糯酒。煮酒。小豆麴酒。香藥麴酒。鹿頭酒。羔兒等酒。今江浙湖南北。又以糯米粉入衆藥和合爲麴。曰餅子酒。至於官務中亦用四夷酒。更別中國不可取以爲法。今醫家所用酒。正宜斟酌。但飲家惟取其味。不顧入藥如何爾。然久之未見不作疾者。蓋此物損益兼行。可不謹歟。漢賜丞相上樽酒。糯爲上。稷爲中。粟爲下者。今入藥佐使。專以糯米用清水白麵麴所造爲正。古人造麴未見入諸藥合和者。如此則功力和厚。皆勝餘酒。今人又以麥蘗造者。蓋止是醴爾。非酒也。書曰若作酒醴。爾惟麴蘗。酒則須用麴醴。故用蘗。蓋酒與醴。其氣味甚

相遼治療豈不殊也。

【蠲豆】有黑白鵲三等。皆於豆莢有白路白者。治霍亂筋轉。

【粳米】白。晚米爲第一早熟。米不及也。平和五藏。補益胃氣。其功莫逮。然稍生則復不益脾。過熟則佳。

【稻米】今造酒者是此。水田米皆謂之稻。前既言粳米。卽此稻米。乃糯稻無疑。溫故可以爲酒。酒爲陽。故多熱。又令人大便堅。非糯稻孰能與於此。西域記。天竺國土濕熱。稻歲四熟。亦可驗矣。

【稷米】今謂之穄米。先諸米熟。又其香可愛。故取以供祭祀。然發故疾。只堪爲飣。不黏着。其味淡。

【罌子粟】其花亦有多葉者。其子一罌數千萬粒。大小如葶藶子。其色白。隔年種則佳。研子。以水煎。仍加蜜爲罌粟湯。服石人甚宜飲。

【醋】酒糟爲之。乞鄰者是此物。然有米醋。麥醋。棗醋。米醋最釅。入藥多用。穀氣全也。故勝糟醋。產婦房中常得醋氣則爲佳。酸益血也。磨雄黃塗蜂螫。亦取其收而不散也。今人食酸則齒軟。謂其水生木。水氣弱。木氣盛。故如是。造靴皮須得此而紋皺。故知其性收斂。不負酸收之說。

【醬】聖人以謂不得卽不食。意欲五味和。五藏悅而受之。此亦安樂之一端。

【小麥】暴淋煎湯飲。爲麪作糊。入藥。水調。治人中暑。馬病肺卒熱。亦以水調灌愈。生嚼成筋。可以黏禽獸。

王雲五主編

叢書集成初編

本草衍義

中華民國二十六年六月初版

編撰者 寇宗奭

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠

國難後一律減價

E九六七